

K. Kardiologjise - Sherbimi i Kardiologjise

Nr	Emertimi	Forca	Vellimi	Doza	Gjendja ne stok
1	1.1% Sucinik acid aldehyde 0.3% dimetoxitetrahydrofuran 2L	0.3% - 1.1%	2L	0.3% - 1.1%	2
2	1.1% Sucinik acid aldehyde 0.3% dimetoxitetrahydrofuran 2L	0.3% - 1.1%	2L	0.3% - 1.1%	4
3	12g Ethanedial, 0.5g Pentanedial 12g/0.5g 5L	//	5L	12g/0.5g	2
4	Acetylsalicylic acid	100mg	/	100mg	169
5	Aminophyline	25mg	1ml	25mg/ml	10
6	Atorvastatin	20mg	//	20mg	1
7	Atropine sulphate	1mg	1mL	1mg	79
8	Atropine sulphate	1mg	1mL	1mg	1
9	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant(PTCA NC Balloons)të përdorura në leziona fokale dhe të gjata,me presion të lartë për optimizimin e trajtimit të lezioneve rezistente në PCI	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës:2.0–5.0mm,Gjatësia e balonës:6–30mm Kompatibilitet: Me tel ndërhyrës 0.014”,Presioni nominal:10 – 12atm,Presioni i vlerësuar i shpërthimit (Rated Burst Pressure - RBP): Deri në 22 atm	0	3

10	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant(PTCA NC Balloons)të përdorura në leziona fokale dhe të gjata,me presion të lartë për optimizimin e trajtimit të lezioneve rezistente në PCI	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës:2.0–5.0mm,Gjatësia e balonës:6–30mm Kompatibilitet: Me tel ndërhyrës 0.014”,Presioni nominal:10 – 12atm,Presioni i vlerësuar i shpërthimit (Rated Burst Pressure - RBP): Deri në 22 atm	0	9
11	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant(PTCA NC Balloons)të përdorura në leziona fokale dhe të gjata,me presion të lartë për optimizimin e trajtimit të lezioneve rezistente në PCI	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës:2.0–5.0mm,Gjatësia e balonës:6–30mm Kompatibilitet: Me tel ndërhyrës 0.014”,Presioni nominal:10 – 12atm,Presioni i vlerësuar i shpërthimit (Rated Burst Pressure - RBP): Deri në 22 atm	0	6

12	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant (PTCA NC Balloons) të përdorura në leziona fokale dhe të gjata, me presion të lartë për optimizimin e trajtimit të lezioneve rezistente në PCI	1. Specifikacioni Teknik, Lloji i produktit: Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon) Diametri i balonës: 2.0–5.0mm, Gjatësia e balonës: 6–30mm Kompatibilitet: Me tel ndërhyrës 0.014”, Presioni nominal: 10 – 12atm, Presioni i vlerësuar i shpërthimit (Rated Burst Pressure - RBP): Deri në 22 atm	0	16
13	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant (PTCA NC Balloons) të përdorura në leziona fokale dhe të gjata, me presion të lartë për optimizimin e trajtimit të lezioneve rezistente në PCI	1. Specifikacioni Teknik, Lloji i produktit: Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon) Diametri i balonës: 2.0–5.0mm, Gjatësia e balonës: 6–30mm Kompatibilitet: Me tel ndërhyrës 0.014”, Presioni nominal: 10 – 12atm, Presioni i vlerësuar i shpërthimit (Rated Burst Pressure - RBP): Deri në 22 atm	0	4

14	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant (PTCA NC Balloons) të përdorura në leziona fokale dhe të gjata, me presion të lartë për optimizimin e trajtimit të lezioneve rezistente në PCI	1. Specifikacioni Teknik, Lloji i produktit: Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon) Diametri i balonës: 2.0–5.0mm, Gjatësia e balonës: 6–30mm Kompatibilitet: Me tel ndërhyrës 0.014”, Presioni nominal: 10 – 12atm, Presioni i vlerësuar i shpërthimit (Rated Burst Pressure - RBP): Deri në 22 atm	0	2
15	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant (PTCA NC Balloons) të përdorura në leziona fokale dhe të gjata, me presion të lartë për optimizimin e trajtimit të lezioneve rezistente në PCI	1. Specifikacioni Teknik, Lloji i produktit: Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon) Diametri i balonës: 2.0–5.0mm, Gjatësia e balonës: 6–30mm Kompatibilitet: Me tel ndërhyrës 0.014”, Presioni nominal: 10 – 12atm, Presioni i vlerësuar i shpërthimit (Rated Burst Pressure - RBP): Deri në 22 atm	0	1

16	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant(PTCA NC Balloons)të përdorura në leziona fokale dhe të gjata,me presion të lartë për optimizimin e trajtimit të lezioneve rezistente në PCI	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës:2.0–5.0mm,Gjatësia e balonës:6–30mm Kompatibilitet: Me tel ndërhyrës 0.014”,Presioni nominal:10 – 12atm,Presioni i vlerësuar i shpërthimit (Rated Burst Pressure - RBP): Deri në 22 atm	0	8
17	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant(PTCA NC Balloons)të përdorura në leziona fokale dhe të gjata,me presion të lartë për optimizimin e trajtimit të lezioneve rezistente në PCI	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës:2.0–5.0mm,Gjatësia e balonës:6–30mm Kompatibilitet: Me tel ndërhyrës 0.014”,Presioni nominal:10 – 12atm,Presioni i vlerësuar i shpërthimit (Rated Burst Pressure - RBP): Deri në 22 atm	0	10

18	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant (PTCA NC Balloons) të përdorura në leziona fokale dhe të gjata, me presion të lartë për optimizimin e trajtimit të lezioneve rezistente në PCI	1. Specifikacioni Teknik, Lloji i produktit: Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon) Diametri i balonës: 2.0–5.0mm, Gjatësia e balonës: 6–30mm Kompatibilitet: Me tel ndërhyrës 0.014”, Presioni nominal: 10 – 12atm, Presioni i vlerësuar i shpërthimit (Rated Burst Pressure - RBP): Deri në 22 atm	0	6
19	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant (PTCA NC Balloons) të përdorura në leziona fokale dhe të gjata, me presion të lartë për optimizimin e trajtimit të lezioneve rezistente në PCI	1. Specifikacioni Teknik, Lloji i produktit: Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon) Diametri i balonës: 2.0–5.0mm, Gjatësia e balonës: 6–30mm Kompatibilitet: Me tel ndërhyrës 0.014”, Presioni nominal: 10 – 12atm, Presioni i vlerësuar i shpërthimit (Rated Burst Pressure - RBP): Deri në 22 atm	0	16

20	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant(PTCA NC Balloons)të përdorura në leziona fokale dhe të gjata,me presion të lartë për optimizimin e trajtimit të lezioneve rezistente në PCI	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës:2.0–5.0mm,Gjatësia e balonës:6–30mm Kompatibilitet: Me tel ndërhyrës 0.014”,Presioni nominal:10 – 12atm,Presioni i vlerësuar i shpërthimit (Rated Burst Pressure - RBP): Deri në 22 atm	0	12
21	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant(PTCA NC Balloons)të përdorura në leziona fokale dhe të gjata,me presion të lartë për optimizimin e trajtimit të lezioneve rezistente në PCI	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës:2.0–5.0mm,Gjatësia e balonës:6–30mm Kompatibilitet: Me tel ndërhyrës 0.014”,Presioni nominal:10 – 12atm,Presioni i vlerësuar i shpërthimit (Rated Burst Pressure - RBP): Deri në 22 atm	0	10

22	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant(PTCA NC Balloons)të përdorura në leziona fokale dhe të gjata,me presion të lartë për optimizimin e trajtimit të lezioneve rezistente në PCI	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës:2.0–5.0mm,Gjatësia e balonës:6–30mm Kompatibilitet: Me tel ndërhyrës 0.014”,Presioni nominal:10 – 12atm,Presioni i vlerësuar i shpërthimit (Rated Burst Pressure - RBP): Deri në 22 atm	0	2
23	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant(PTCA NC Balloons)të përdorura në leziona fokale dhe të gjata,me presion të lartë për optimizimin e trajtimit të lezioneve rezistente në PCI	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës:2.0–5.0mm,Gjatësia e balonës:6–30mm Kompatibilitet: Me tel ndërhyrës 0.014”,Presioni nominal:10 – 12atm,Presioni i vlerësuar i shpërthimit (Rated Burst Pressure - RBP): Deri në 22 atm	0	3

24	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant(PTCA NC Balloons)të përdorura në leziona fokale dhe të gjata,me presion të lartë për optimizimin e trajtimit të lezioneve rezistente në PCI	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës:2.0–5.0mm,Gjatësia e balonës:6–30mm Kompatibilitet: Me tel ndërhyrës 0.014”,Presioni nominal:10 – 12atm,Presioni i vlerësuar i shpërthimit (Rated Burst Pressure - RBP): Deri në 22 atm	0	6
25	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant(PTCA NC Balloons)të përdorura në leziona fokale dhe të gjata,me presion të lartë për optimizimin e trajtimit të lezioneve rezistente në PCI	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës:2.0–5.0mm,Gjatësia e balonës:6–30mm Kompatibilitet: Me tel ndërhyrës 0.014”,Presioni nominal:10 – 12atm,Presioni i vlerësuar i shpërthimit (Rated Burst Pressure - RBP): Deri në 22 atm	0	8

26	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant(PTCA NC Balloons)të përdorura në leziona fokale dhe të gjata,me presion të lartë për optimizimin e trajtimit të lezioneve rezistente në PCI	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës:2.0–5.0mm,Gjatësia e balonës:6–30mm Kompatibilitet: Me tel ndërhyrës 0.014”,Presioni nominal:10 – 12atm,Presioni i vlerësuar i shpërthimit (Rated Burst Pressure - RBP): Deri në 22 atm	0	7
27	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant(PTCA NC Balloons)të përdorura në leziona fokale dhe të gjata,me presion të lartë për optimizimin e trajtimit të lezioneve rezistente në PCI	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës:2.0–5.0mm,Gjatësia e balonës:6–30mm Kompatibilitet: Me tel ndërhyrës 0.014”,Presioni nominal:10 – 12atm,Presioni i vlerësuar i shpërthimit (Rated Burst Pressure - RBP): Deri në 22 atm	0	7

28	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant(PTCA NC Balloons)të përdorura në leziona fokale dhe të gjata,me presion të lartë për optimizimin e trajtimit të lezioneve rezistente në PCI	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës:2.0–5.0mm,Gjatësia e balonës:6–30mm Kompatibilitet: Me tel ndërhyrës 0.014”,Presioni nominal:10 – 12atm,Presioni i vlerësuar i shpërthimit (Rated Burst Pressure - RBP): Deri në 22 atm	0	4
29	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant(PTCA NC Balloons)të përdorura në leziona fokale dhe të gjata,me presion të lartë për optimizimin e trajtimit të lezioneve rezistente në PCI	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës:2.0–5.0mm,Gjatësia e balonës:6–30mm Kompatibilitet: Me tel ndërhyrës 0.014”,Presioni nominal:10 – 12atm,Presioni i vlerësuar i shpërthimit (Rated Burst Pressure - RBP): Deri në 22 atm	0	7

30	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant(PTCA NC Balloons)të përdorura në leziona fokale dhe të gjata,me presion të lartë për optimizimin e trajtimit të lezioneve rezistente në PCI	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës:2.0–5.0mm,Gjatësia e balonës:6–30mm Kompatibilitet: Me tel ndërhyrës 0.014”,Presioni nominal:10 – 12atm,Presioni i vlerësuar i shpërthimit (Rated Burst Pressure - RBP): Deri në 22 atm	0	6
31	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant(PTCA NC Balloons)të përdorura në leziona fokale dhe të gjata,me presion të lartë për optimizimin e trajtimit të lezioneve rezistente në PCI	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës:2.0–5.0mm,Gjatësia e balonës:6–30mm Kompatibilitet: Me tel ndërhyrës 0.014”,Presioni nominal:10 – 12atm,Presioni i vlerësuar i shpërthimit (Rated Burst Pressure - RBP): Deri në 22 atm	0	7

32	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant(PTCA NC Balloons)të përdorura në leziona fokale dhe të gjata,me presion të lartë për optimizimin e trajtimit të lezioneve rezistente në PCI	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës:2.0–5.0mm,Gjatësia e balonës:6–30mm Kompatibilitet: Me tel ndërhyrës 0.014”,Presioni nominal:10 – 12atm,Presioni i vlerësuar i shpërthimit (Rated Burst Pressure - RBP): Deri në 22 atm	0	2
33	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant(PTCA NC Balloons)të përdorura në leziona fokale dhe të gjata,me presion të lartë për optimizimin e trajtimit të lezioneve rezistente në PCI	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës:2.0–5.0mm,Gjatësia e balonës:6–30mm Kompatibilitet: Me tel ndërhyrës 0.014”,Presioni nominal:10 – 12atm,Presioni i vlerësuar i shpërthimit (Rated Burst Pressure - RBP): Deri në 22 atm	0	15

34	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant(PTCA NC Balloons)të përdorura në leziona fokale dhe të gjata,me presion të lartë për optimizimin e trajtimit të lezioneve rezistente në PCI	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës:2.0–5.0mm,Gjatësia e balonës:6–30mm Kompatibilitet: Me tel ndërhyrës 0.014”,Presioni nominal:10 – 12atm,Presioni i vlerësuar i shpërthimit (Rated Burst Pressure - RBP): Deri në 22 atm	0	8
35	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant(PTCA NC Balloons)të përdorura në leziona fokale dhe të gjata,me presion të lartë për optimizimin e trajtimit të lezioneve rezistente në PCI	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës:2.0–5.0mm,Gjatësia e balonës:6–30mm Kompatibilitet: Me tel ndërhyrës 0.014”,Presioni nominal:10 – 12atm,Presioni i vlerësuar i shpërthimit (Rated Burst Pressure - RBP): Deri në 22 atm	0	16

36	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant(PTCA NC Balloons)të përdorura në leziona fokale dhe të gjata,me presion të lartë për optimizimin e trajtimit të lezioneve rezistente në PCI	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës:2.0–5.0mm,Gjatësia e balonës:6–30mm Kompatibilitet: Me tel ndërhyrës 0.014”,Presioni nominal:10 – 12atm,Presioni i vlerësuar i shpërthimit (Rated Burst Pressure - RBP): Deri në 22 atm	0	4
37	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant(PTCA NC Balloons)të përdorura në leziona fokale dhe të gjata,me presion të lartë për optimizimin e trajtimit të lezioneve rezistente në PCI	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës:2.0–5.0mm,Gjatësia e balonës:6–30mm Kompatibilitet: Me tel ndërhyrës 0.014”,Presioni nominal:10 – 12atm,Presioni i vlerësuar i shpërthimit (Rated Burst Pressure - RBP): Deri në 22 atm	0	18

38	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant (PTCA NC Balloons) të përdorura në leziona fokale dhe të gjata, me presion të lartë për optimizimin e trajtimit të lezioneve rezistente në PCI	1. Specifikacioni Teknik, Lloji i produktit: Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon) Diametri i balonës: 2.0–5.0mm, Gjatësia e balonës: 6–30mm Kompatibilitet: Me tel ndërhyrës 0.014”, Presioni nominal: 10 – 12atm, Presioni i vlerësuar i shpërthimit (Rated Burst Pressure - RBP): Deri në 22 atm	0	14
39	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant (PTCA NC Balloons) të përdorura në leziona fokale dhe të gjata, me presion të lartë për optimizimin e trajtimit të lezioneve rezistente në PCI	1. Specifikacioni Teknik, Lloji i produktit: Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon) Diametri i balonës: 2.0–5.0mm, Gjatësia e balonës: 6–30mm Kompatibilitet: Me tel ndërhyrës 0.014”, Presioni nominal: 10 – 12atm, Presioni i vlerësuar i shpërthimit (Rated Burst Pressure - RBP): Deri në 22 atm	0	10

40	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant (PTCA NC Balloons) të përdorura në leziona fokale dhe të gjata, me presion të lartë për optimizimin e trajtimit të lezioneve rezistente në PCI	1. Specifikacioni Teknik, Lloji i produktit: Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon) Diametri i balonës: 2.0–5.0mm, Gjatësia e balonës: 6–30mm Kompatibilitet: Me tel ndërhyrës 0.014”, Presioni nominal: 10 – 12atm, Presioni i vlerësuar i shpërthimit (Rated Burst Pressure - RBP): Deri në 22 atm	0	18
41	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant (PTCA NC Balloons) të përdorura në leziona fokale dhe të gjata, me presion të lartë për optimizimin e trajtimit të lezioneve rezistente në PCI	1. Specifikacioni Teknik, Lloji i produktit: Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon) Diametri i balonës: 2.0–5.0mm, Gjatësia e balonës: 6–30mm Kompatibilitet: Me tel ndërhyrës 0.014”, Presioni nominal: 10 – 12atm, Presioni i vlerësuar i shpërthimit (Rated Burst Pressure - RBP): Deri në 22 atm	0	7

42	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant(PTCA NC Balloons)të përdorura në leziona fokale dhe të gjata,me presion të lartë për optimizimin e trajtimit të lezioneve rezistente në PCI	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës:2.0–5.0mm,Gjatësia e balonës:6–30mm Kompatibilitet: Me tel ndërhyrës 0.014”,Presioni nominal:10 – 12atm,Presioni i vlerësuar i shpërthimit (Rated Burst Pressure - RBP): Deri në 22 atm	0	9
43	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant(PTCA NC Balloons)të përdorura në leziona fokale dhe të gjata,me presion të lartë për optimizimin e trajtimit të lezioneve rezistente në PCI	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës:2.0–5.0mm,Gjatësia e balonës:6–30mm Kompatibilitet: Me tel ndërhyrës 0.014”,Presioni nominal:10 – 12atm,Presioni i vlerësuar i shpërthimit (Rated Burst Pressure - RBP): Deri në 22 atm	0	5

44	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant(PTCA NC Balloons)të përdorura në leziona fokale dhe të gjata,me presion të lartë për optimizimin e trajtimit të lezioneve rezistente në PCI	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës:2.0–5.0mm,Gjatësia e balonës:6–30mm Kompatibilitet: Me tel ndërhyrës 0.014”,Presioni nominal:10 – 12atm,Presioni i vlerësuar i shpërthimit (Rated Burst Pressure - RBP): Deri në 22 atm	0	5
45	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant(PTCA NC Balloons)të përdorura në leziona fokale dhe të gjata,me presion të lartë për optimizimin e trajtimit të lezioneve rezistente në PCI	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës:2.0–5.0mm,Gjatësia e balonës:6–30mm Kompatibilitet: Me tel ndërhyrës 0.014”,Presioni nominal:10 – 12atm,Presioni i vlerësuar i shpërthimit (Rated Burst Pressure - RBP): Deri në 22 atm	0	3

46	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant(PTCA NC Balloons)të përdorura në leziona fokale dhe të gjata,me presion të lartë për optimizimin e trajtimit të lezioneve rezistente në PCI	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës:2.0–5.0mm,Gjatësia e balonës:6–30mm Kompatibilitet: Me tel ndërhyrës 0.014”,Presioni nominal:10 – 12atm,Presioni i vlerësuar i shpërthimit (Rated Burst Pressure - RBP): Deri në 22 atm	0	2
47	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant(PTCA NC Balloons)të përdorura në leziona fokale dhe të gjata,me presion të lartë për optimizimin e trajtimit të lezioneve rezistente në PCI	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës:2.0–5.0mm,Gjatësia e balonës:6–30mm Kompatibilitet: Me tel ndërhyrës 0.014”,Presioni nominal:10 – 12atm,Presioni i vlerësuar i shpërthimit (Rated Burst Pressure - RBP): Deri në 22 atm	0	1

48	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant (PTCA NC Balloons) të përdorura në leziona fokale dhe të gjata, me presion të lartë për optimizimin e trajtimit të lezioneve rezistente në PCI	1. Specifikacioni Teknik, Lloji i produktit: Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon) Diametri i balonës: 2.0–5.0mm, Gjatësia e balonës: 6–30mm Kompatibilitet: Me tel ndërhyrës 0.014”, Presioni nominal: 10 – 12atm, Presioni i vlerësuar i shpërthimit (Rated Burst Pressure - RBP): Deri në 22 atm	0	1
49	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant (PTCA NC Balloons) të përdorura në leziona fokale dhe të gjata, me presion të lartë për optimizimin e trajtimit të lezioneve rezistente në PCI	1. Specifikacioni Teknik, Lloji i produktit: Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon) Diametri i balonës: 2.0–5.0mm, Gjatësia e balonës: 6–30mm Kompatibilitet: Me tel ndërhyrës 0.014”, Presioni nominal: 10 – 12atm, Presioni i vlerësuar i shpërthimit (Rated Burst Pressure - RBP): Deri në 22 atm	0	6

50	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant (PTCA NC Balloons) të përdorura në leziona fokale dhe të gjata, me presion të lartë për optimizimin e trajtimit të lezioneve rezistente në PCI	1. Specifikacioni Teknik, Lloji i produktit: Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon) Diametri i balonës: 2.0–5.0mm, Gjatësia e balonës: 6–30mm Kompatibilitet: Me tel ndërhyrës 0.014”, Presioni nominal: 10 – 12atm, Presioni i vlerësuar i shpërthimit (Rated Burst Pressure - RBP): Deri në 22 atm	0	2
51	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant (PTCA NC Balloons) të përdorura në leziona fokale dhe të gjata, me presion të lartë për optimizimin e trajtimit të lezioneve rezistente në PCI	1. Specifikacioni Teknik, Lloji i produktit: Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon) Diametri i balonës: 2.0–5.0mm, Gjatësia e balonës: 6–30mm Kompatibilitet: Me tel ndërhyrës 0.014”, Presioni nominal: 10 – 12atm, Presioni i vlerësuar i shpërthimit (Rated Burst Pressure - RBP): Deri në 22 atm	0	13

52	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant(PTCA NC Balloons)të përdorura në leziona fokale dhe të gjata,me presion të lartë për optimizimin e trajtimit të lezioneve rezistente në PCI	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës:2.0–5.0mm,Gjatësia e balonës:6–30mm Kompatibilitet: Me tel ndërhyrës 0.014”,Presioni nominal:10 – 12atm,Presioni i vlerësuar i shpërthimit (Rated Burst Pressure - RBP): Deri në 22 atm	0	6
53	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant(PTCA NC Balloons)të përdorura në leziona fokale dhe të gjata,me presion të lartë për optimizimin e trajtimit të lezioneve rezistente në PCI	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës:2.0–5.0mm,Gjatësia e balonës:6–30mm Kompatibilitet: Me tel ndërhyrës 0.014”,Presioni nominal:10 – 12atm,Presioni i vlerësuar i shpërthimit (Rated Burst Pressure - RBP): Deri në 22 atm	0	3

54	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant (PTCA NC Balloons) të përdorura në leziona fokale dhe të gjata, me presion të lartë për optimizimin e trajtimit të lezioneve rezistente në PCI	1. Specifikacioni Teknik, Lloji i produktit: Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon) Diametri i balonës: 2.0–5.0mm, Gjatësia e balonës: 6–30mm Kompatibilitet: Me tel ndërhyrës 0.014”, Presioni nominal: 10 – 12atm, Presioni i vlerësuar i shpërthimit (Rated Burst Pressure - RBP): Deri në 22 atm	0	18
55	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant (PTCA NC Balloons) të përdorura në leziona fokale dhe të gjata, me presion të lartë për optimizimin e trajtimit të lezioneve rezistente në PCI	1. Specifikacioni Teknik, Lloji i produktit: Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon) Diametri i balonës: 2.0–5.0mm, Gjatësia e balonës: 6–30mm Kompatibilitet: Me tel ndërhyrës 0.014”, Presioni nominal: 10 – 12atm, Presioni i vlerësuar i shpërthimit (Rated Burst Pressure - RBP): Deri në 22 atm	0	16

56	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant(PTCA NC Balloons)të përdorura në leziona fokale dhe të gjata,me presion të lartë për optimizimin e trajtimit të lezioneve rezistente në PCI	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës:2.0–5.0mm,Gjatësia e balonës:6–30mm Kompatibilitet: Me tel ndërhyrës 0.014”,Presioni nominal:10 – 12atm,Presioni i vlerësuar i shpërthimit (Rated Burst Pressure - RBP): Deri në 22 atm	0	7
57	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant(PTCA NC Balloons)të përdorura në leziona fokale dhe të gjata,me presion të lartë për optimizimin e trajtimit të lezioneve rezistente në PCI	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës:2.0–5.0mm,Gjatësia e balonës:6–30mm Kompatibilitet: Me tel ndërhyrës 0.014”,Presioni nominal:10 – 12atm,Presioni i vlerësuar i shpërthimit (Rated Burst Pressure - RBP): Deri në 22 atm	0	3

58	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant(PTCA NC Balloons)të përdorura në leziona fokale dhe të gjata,me presion të lartë për optimizimin e trajtimit të lezioneve rezistente në PCI	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës:2.0–5.0mm,Gjatësia e balonës:6–30mm Kompatibilitet: Me tel ndërhyrës 0.014”,Presioni nominal:10 – 12atm,Presioni i vlerësuar i shpërthimit (Rated Burst Pressure - RBP): Deri në 22 atm	0	5
59	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant(PTCA NC Balloons)të përdorura në leziona fokale dhe të gjata,me presion të lartë për optimizimin e trajtimit të lezioneve rezistente në PCI	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës:2.0–5.0mm,Gjatësia e balonës:6–30mm Kompatibilitet: Me tel ndërhyrës 0.014”,Presioni nominal:10 – 12atm,Presioni i vlerësuar i shpërthimit (Rated Burst Pressure - RBP): Deri në 22 atm	0	9

60	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant(PTCA NC Balloons)të përdorura në leziona fokale dhe të gjata,me presion të lartë për optimizimin e trajtimit të lezioneve rezistente në PCI	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës:2.0–5.0mm,Gjatësia e balonës:6–30mm Kompatibilitet: Me tel ndërhyrës 0.014”,Presioni nominal:10 – 12atm,Presioni i vlerësuar i shpërthimit (Rated Burst Pressure - RBP): Deri në 22 atm	0	14
61	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant(PTCA NC Balloons)të përdorura në leziona fokale dhe të gjata,me presion të lartë për optimizimin e trajtimit të lezioneve rezistente në PCI	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës:2.0–5.0mm,Gjatësia e balonës:6–30mm Kompatibilitet: Me tel ndërhyrës 0.014”,Presioni nominal:10 – 12atm,Presioni i vlerësuar i shpërthimit (Rated Burst Pressure - RBP): Deri në 22 atm	0	4

62	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant (PTCA NC Balloons) të përdorura në leziona fokale dhe të gjata, me presion të lartë për optimizimin e trajtimit të lezioneve rezistente në PCI	1. Specifikacioni Teknik, Lloji i produktit: Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon) Diametri i balonës: 2.0–5.0mm, Gjatësia e balonës: 6–30mm Kompatibilitet: Me tel ndërhyrës 0.014”, Presioni nominal: 10 – 12atm, Presioni i vlerësuar i shpërthimit (Rated Burst Pressure - RBP): Deri në 22 atm	0	2
63	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant (PTCA NC Balloons) të përdorura në leziona fokale dhe të gjata, me presion të lartë për optimizimin e trajtimit të lezioneve rezistente në PCI	1. Specifikacioni Teknik, Lloji i produktit: Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon) Diametri i balonës: 2.0–5.0mm, Gjatësia e balonës: 6–30mm Kompatibilitet: Me tel ndërhyrës 0.014”, Presioni nominal: 10 – 12atm, Presioni i vlerësuar i shpërthimit (Rated Burst Pressure - RBP): Deri në 22 atm	0	18

64	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant (PTCA NC Balloons) të përdorura në leziona fokale dhe të gjata, me presion të lartë për optimizimin e trajtimit të lezioneve rezistente në PCI	1. Specifikacioni Teknik, Lloji i produktit: Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon) Diametri i balonës: 2.0–5.0mm, Gjatësia e balonës: 6–30mm Kompatibilitet: Me tel ndërhyrës 0.014”, Presioni nominal: 10 – 12atm, Presioni i vlerësuar i shpërthimit (Rated Burst Pressure - RBP): Deri në 22 atm	0	7
65	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant (PTCA NC Balloons) të përdorura në leziona fokale dhe të gjata, me presion të lartë për optimizimin e trajtimit të lezioneve rezistente në PCI	1. Specifikacioni Teknik, Lloji i produktit: Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon) Diametri i balonës: 2.0–5.0mm, Gjatësia e balonës: 6–30mm Kompatibilitet: Me tel ndërhyrës 0.014”, Presioni nominal: 10 – 12atm, Presioni i vlerësuar i shpërthimit (Rated Burst Pressure - RBP): Deri në 22 atm	0	7

66	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant (PTCA NC Balloons) të përdorura në leziona fokale dhe të gjata, me presion të lartë për optimizimin e trajtimit të lezioneve rezistente në PCI	1. Specifikacioni Teknik, Lloji i produktit: Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon) Diametri i balonës: 2.0–5.0mm, Gjatësia e balonës: 6–30mm Kompatibilitet: Me tel ndërhyrës 0.014", Presioni nominal: 10 – 12atm, Presioni i vlerësuar i shpërthimit (Rated Burst Pressure - RBP): Deri në 22 atm	0	20
67	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuara) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuara) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	0	2
68	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuara) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuara) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	0	8

69	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuara) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuara) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	0	6
70	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuara) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuara) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	0	5
71	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuara) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuara) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	0	19

72	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuara) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuara) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	0	7
73	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuara) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuara) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	0	5
74	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuara) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuara) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	0	28

75	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuara) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuara) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	0	14
76	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuara) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuara) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	0	19
77	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuara) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuara) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	0	7

78	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuara) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuara) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	0	6
79	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuara) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuara) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	0	26
80	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuara) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuara) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	0	5

81	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuara) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuara) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	0	18
82	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuara) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuara) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	0	7
83	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuara) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuara) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	0	12

84	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuara) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuara) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	0	5
85	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuara) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuara) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	0	2
86	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuara) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuara) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	0	9

87	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuara) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuara) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	0	10
88	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuara) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuara) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	0	2
89	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuara) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuara) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	0	4

90	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuara) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuara) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	0	36
91	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuara) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuara) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	0	20
92	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuara) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuara) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	0	13

93	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuara) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuara) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	0	5
94	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuara) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuara) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	0	22
95	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuara) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuara) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	0	22

96	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuara) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuara) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	0	28
97	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuara) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuara) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	0	2
98	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuara) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuara) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	0	4

99	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuara) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuara) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	0	6
100	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuara) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuara) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	0	8
101	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuara) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuara) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	0	7

102	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm,low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuara) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm,low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuara) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	0	15
103	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm,low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuara) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm,low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuara) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	0	18
104	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm,low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuara) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm,low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuara) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	0	1

105	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuara) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuara) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	0	18
106	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuara) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuara) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	0	4
107	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuara) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuara) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	0	10

108	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuara) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuara) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	0	17
109	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuara) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuara) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	0	2
110	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuara) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuara) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	0	23

111	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuara) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuara) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	0	15
112	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuara) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuara) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	0	19
113	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuara) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuara) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	0	9

114	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuara) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuara) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	0	10
115	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuara) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuara) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	0	2
116	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuara) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuara) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	0	1

117	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuara) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuara) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	0	2
118	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuara) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuara) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	0	50
119	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuara) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuara) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	0	5

120	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuara) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuara) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	0	4
121	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuara) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuara) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	0	7
122	Balloon Catheter koronar- Noncompliant, për dilatim stenti me presion të lartë dhe postdilatim, me dy marker, në interval gjatësie së paku 6mm deri 30 mm, në interval diametri 2.0mm - 4.0mm si dhe me presion mesatar të kapacitetit mbi 27atm, kompatibil per "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar- Noncompliant, për dilatim stenti me presion të lartë dhe postdilatim, me dy marker, në interval gjatësie së paku 6mm deri 30 mm, në interval diametri 2.0mm - 4.0mm si dhe me presion mesatar të kapacitetit mbi 27atm, kompatibil per "kissing" balon teknik për Guiding catheter	0	4

123	Balloon Catheter koronar- Noncompliant, për dilatim stenti me presion të lartë dhe postdilatim, me dy marker, në interval gjatësie së paku 6mm deri 30 mm, në interval diametri 2.0mm - 4.0mm si dhe me presion mesatar të kapacitetit mbi 27atm, kompatibil per "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar- Noncompliant, për dilatim stenti me presion të lartë dhe postdilatim, me dy marker, në interval gjatësie së paku 6mm deri 30 mm, në interval diametri 2.0mm - 4.0mm si dhe me presion mesatar të kapacitetit mbi 27atm, kompatibil per "kissing" balon teknik për Guiding catheter	0	11
124	Balloon Catheter koronar- Noncompliant, për dilatim stenti me presion të lartë dhe postdilatim, me dy marker, në interval gjatësie së paku 6mm deri 30 mm, në interval diametri 2.0mm - 4.0mm si dhe me presion mesatar të kapacitetit mbi 27atm, kompatibil per "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar- Noncompliant, për dilatim stenti me presion të lartë dhe postdilatim, me dy marker, në interval gjatësie së paku 6mm deri 30 mm, në interval diametri 2.0mm - 4.0mm si dhe me presion mesatar të kapacitetit mbi 27atm, kompatibil per "kissing" balon teknik për Guiding catheter	0	7
125	Balloon Catheter koronar- Noncompliant, për dilatim stenti me presion të lartë dhe postdilatim, me dy marker, në interval gjatësie së paku 6mm deri 30 mm, në interval diametri 2.0mm - 4.0mm si dhe me presion mesatar të kapacitetit mbi 27atm, kompatibil per "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar- Noncompliant, për dilatim stenti me presion të lartë dhe postdilatim, me dy marker, në interval gjatësie së paku 6mm deri 30 mm, në interval diametri 2.0mm - 4.0mm si dhe me presion mesatar të kapacitetit mbi 27atm, kompatibil per "kissing" balon teknik për Guiding catheter	0	4

126	Balloon Catheter koronar- Noncompliant, për dilatim stenti me presion të lartë dhe postdilatim, me dy marker, në interval gjatësie së paku 6mm deri 30 mm, në interval diametri 2.0mm - 4.0mm si dhe me presion mesatar të kapacitetit mbi 27atm, kompatibil per "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar- Noncompliant, për dilatim stenti me presion të lartë dhe postdilatim, me dy marker, në interval gjatësie së paku 6mm deri 30 mm, në interval diametri 2.0mm - 4.0mm si dhe me presion mesatar të kapacitetit mbi 27atm, kompatibil per "kissing" balon teknik për Guiding catheter	0	20
127	Balloon Catheter koronar- Noncompliant, për dilatim stenti me presion të lartë dhe postdilatim, me dy marker, në interval gjatësie së paku 6mm deri 30 mm, në interval diametri 2.0mm - 4.0mm si dhe me presion mesatar të kapacitetit mbi 27atm, kompatibil per "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar- Noncompliant, për dilatim stenti me presion të lartë dhe postdilatim, me dy marker, në interval gjatësie së paku 6mm deri 30 mm, në interval diametri 2.0mm - 4.0mm si dhe me presion mesatar të kapacitetit mbi 27atm, kompatibil per "kissing" balon teknik për Guiding catheter	0	8
128	Balloon Catheter koronar- Noncompliant, për dilatim stenti me presion të lartë dhe postdilatim, me dy marker, në interval gjatësie së paku 6mm deri 30 mm, në interval diametri 2.0mm - 4.0mm si dhe me presion mesatar të kapacitetit mbi 27atm, kompatibil per "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar- Noncompliant, për dilatim stenti me presion të lartë dhe postdilatim, me dy marker, në interval gjatësie së paku 6mm deri 30 mm, në interval diametri 2.0mm - 4.0mm si dhe me presion mesatar të kapacitetit mbi 27atm, kompatibil per "kissing" balon teknik për Guiding catheter	0	2

129	Balloon Catheter koronar- Noncompliant, për dilatim stenti me presion të lartë dhe postdilatim, me dy marker, në interval gjatësie së paku 6mm deri 30 mm, në interval diametri 2.0mm - 4.0mm si dhe me presion mesatar të kapacitetit mbi 27atm, kompatibil per "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar- Noncompliant, për dilatim stenti me presion të lartë dhe postdilatim, me dy marker, në interval gjatësie së paku 6mm deri 30 mm, në interval diametri 2.0mm - 4.0mm si dhe me presion mesatar të kapacitetit mbi 27atm, kompatibil per "kissing" balon teknik për Guiding catheter	0	6
130	Balloon Catheter koronar- Noncompliant, për dilatim stenti me presion të lartë dhe postdilatim, me dy marker, në interval gjatësie së paku 6mm deri 30 mm, në interval diametri 2.0mm - 4.0mm si dhe me presion mesatar të kapacitetit mbi 27atm, kompatibil per "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar- Noncompliant, për dilatim stenti me presion të lartë dhe postdilatim, me dy marker, në interval gjatësie së paku 6mm deri 30 mm, në interval diametri 2.0mm - 4.0mm si dhe me presion mesatar të kapacitetit mbi 27atm, kompatibil per "kissing" balon teknik për Guiding catheter	0	3
131	Balloon Catheter koronar- Noncompliant, për dilatim stenti me presion të lartë dhe postdilatim, me dy marker, në interval gjatësie së paku 6mm deri 30 mm, në interval diametri 2.0mm - 4.0mm si dhe me presion mesatar të kapacitetit mbi 27atm, kompatibil per "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar- Noncompliant, për dilatim stenti me presion të lartë dhe postdilatim, me dy marker, në interval gjatësie së paku 6mm deri 30 mm, në interval diametri 2.0mm - 4.0mm si dhe me presion mesatar të kapacitetit mbi 27atm, kompatibil per "kissing" balon teknik për Guiding catheter	0	6

132	Balloon Catheter koronar- Noncompliant, për dilatim stenti me presion të lartë dhe postdilatim, me dy marker, në interval gjatësie së paku 6mm deri 30 mm, në interval diametri 2.0mm - 4.0mm si dhe me presion mesatar të kapacitetit mbi 27atm, kompatibil per "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar- Noncompliant, për dilatim stenti me presion të lartë dhe postdilatim, me dy marker, në interval gjatësie së paku 6mm deri 30 mm, në interval diametri 2.0mm - 4.0mm si dhe me presion mesatar të kapacitetit mbi 27atm, kompatibil per "kissing" balon teknik për Guiding catheter	0	10
133	Balloon Catheter koronar- Noncompliant, për dilatim stenti me presion të lartë dhe postdilatim, me dy marker, në interval gjatësie së paku 6mm deri 30 mm, në interval diametri 2.0mm - 4.0mm si dhe me presion mesatar të kapacitetit mbi 27atm, kompatibil per "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar- Noncompliant, për dilatim stenti me presion të lartë dhe postdilatim, me dy marker, në interval gjatësie së paku 6mm deri 30 mm, në interval diametri 2.0mm - 4.0mm si dhe me presion mesatar të kapacitetit mbi 27atm, kompatibil per "kissing" balon teknik për Guiding catheter	0	21
134	Balloon Catheter koronar- Noncompliant, për dilatim stenti me presion të lartë dhe postdilatim, me dy marker, në interval gjatësie së paku 6mm deri 30 mm, në interval diametri 2.0mm - 4.0mm si dhe me presion mesatar të kapacitetit mbi 27atm, kompatibil per "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar- Noncompliant, për dilatim stenti me presion të lartë dhe postdilatim, me dy marker, në interval gjatësie së paku 6mm deri 30 mm, në interval diametri 2.0mm - 4.0mm si dhe me presion mesatar të kapacitetit mbi 27atm, kompatibil per "kissing" balon teknik për Guiding catheter	0	25

135	Balloon Catheter koronar- Noncompliant, për dilatim stenti me presion të lartë dhe postdilatim, me dy marker, në interval gjatësie së paku 6mm deri 30 mm, në interval diametri 2.0mm - 4.0mm si dhe me presion mesatar të kapacitetit mbi 27atm, kompatibil per "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar- Noncompliant, për dilatim stenti me presion të lartë dhe postdilatim, me dy marker, në interval gjatësie së paku 6mm deri 30 mm, në interval diametri 2.0mm - 4.0mm si dhe me presion mesatar të kapacitetit mbi 27atm, kompatibil per "kissing" balon teknik për Guiding catheter	0	3
136	Balloon Catheter koronar- Noncompliant, për dilatim stenti me presion të lartë dhe postdilatim, me dy marker, në interval gjatësie së paku 6mm deri 30 mm, në interval diametri 2.0mm - 4.0mm si dhe me presion mesatar të kapacitetit mbi 27atm, kompatibil per "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar- Noncompliant, për dilatim stenti me presion të lartë dhe postdilatim, me dy marker, në interval gjatësie së paku 6mm deri 30 mm, në interval diametri 2.0mm - 4.0mm si dhe me presion mesatar të kapacitetit mbi 27atm, kompatibil per "kissing" balon teknik për Guiding catheter	0	5
137	Balloon Catheter koronar- Noncompliant, për dilatim stenti me presion të lartë dhe postdilatim, me dy marker, në interval gjatësie së paku 6mm deri 30 mm, në interval diametri 2.0mm - 4.0mm si dhe me presion mesatar të kapacitetit mbi 27atm, kompatibil per "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar- Noncompliant, për dilatim stenti me presion të lartë dhe postdilatim, me dy marker, në interval gjatësie së paku 6mm deri 30 mm, në interval diametri 2.0mm - 4.0mm si dhe me presion mesatar të kapacitetit mbi 27atm, kompatibil per "kissing" balon teknik për Guiding catheter	0	28

138	Balloon Catheter koronar- Noncompliant, për dilatim stenti me presion të lartë dhe postdilatim, me dy marker, në interval gjatësie së paku 6mm deri 30 mm, në interval diametri 2.0mm - 4.0mm si dhe me presion mesatar të kapacitetit mbi 27atm, kompatibil per "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar- Noncompliant, për dilatim stenti me presion të lartë dhe postdilatim, me dy marker, në interval gjatësie së paku 6mm deri 30 mm, në interval diametri 2.0mm - 4.0mm si dhe me presion mesatar të kapacitetit mbi 27atm, kompatibil per "kissing" balon teknik për Guiding catheter	0	4
139	Balloon Catheter koronar- Noncompliant, për dilatim stenti me presion të lartë dhe postdilatim, me dy marker, në interval gjatësie së paku 6mm deri 30 mm, në interval diametri 2.0mm - 4.0mm si dhe me presion mesatar të kapacitetit mbi 27atm, kompatibil per "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar- Noncompliant, për dilatim stenti me presion të lartë dhe postdilatim, me dy marker, në interval gjatësie së paku 6mm deri 30 mm, në interval diametri 2.0mm - 4.0mm si dhe me presion mesatar të kapacitetit mbi 27atm, kompatibil per "kissing" balon teknik për Guiding catheter	0	7
140	Balloon Catheter koronar- Noncompliant, për dilatim stenti me presion të lartë dhe postdilatim, me dy marker, në interval gjatësie së paku 6mm deri 30 mm, në interval diametri 2.0mm - 4.0mm si dhe me presion mesatar të kapacitetit mbi 27atm, kompatibil per "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar- Noncompliant, për dilatim stenti me presion të lartë dhe postdilatim, me dy marker, në interval gjatësie së paku 6mm deri 30 mm, në interval diametri 2.0mm - 4.0mm si dhe me presion mesatar të kapacitetit mbi 27atm, kompatibil per "kissing" balon teknik për Guiding catheter	0	25

141	Balloon Catheter koronar- Noncompliant, për dilatim stenti me presion të lartë dhe postdilatim, me dy marker, në interval gjatësie së paku 6mm deri 30 mm, në interval diametri 2.0mm - 4.0mm si dhe me presion mesatar të kapacitetit mbi 27atm, kompatibil per "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar- Noncompliant, për dilatim stenti me presion të lartë dhe postdilatim, me dy marker, në interval gjatësie së paku 6mm deri 30 mm, në interval diametri 2.0mm - 4.0mm si dhe me presion mesatar të kapacitetit mbi 27atm, kompatibil per "kissing" balon teknik për Guiding catheter	0	4
142	Balloon Catheter koronar- Noncompliant, për dilatim stenti me presion të lartë dhe postdilatim, me dy marker, në interval gjatësie së paku 6mm deri 30 mm, në interval diametri 2.0mm - 4.0mm si dhe me presion mesatar të kapacitetit mbi 27atm, kompatibil per "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar- Noncompliant, për dilatim stenti me presion të lartë dhe postdilatim, me dy marker, në interval gjatësie së paku 6mm deri 30 mm, në interval diametri 2.0mm - 4.0mm si dhe me presion mesatar të kapacitetit mbi 27atm, kompatibil per "kissing" balon teknik për Guiding catheter	0	15
143	Balloon Catheter koronar- Noncompliant, për dilatim stenti me presion të lartë dhe postdilatim, me dy marker, në interval gjatësie së paku 6mm deri 30 mm, në interval diametri 2.0mm - 4.0mm si dhe me presion mesatar të kapacitetit mbi 27atm, kompatibil per "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar- Noncompliant, për dilatim stenti me presion të lartë dhe postdilatim, me dy marker, në interval gjatësie së paku 6mm deri 30 mm, në interval diametri 2.0mm - 4.0mm si dhe me presion mesatar të kapacitetit mbi 27atm, kompatibil per "kissing" balon teknik për Guiding catheter	0	1

144	Balloon Catheter koronar- Noncompliant, për dilatim stenti me presion të lartë dhe postdilatim, me dy marker, në interval gjatësie së paku 6mm deri 30 mm, në interval diametri 2.0mm - 4.0mm si dhe me presion mesatar të kapacitetit mbi 27atm, kompatibil per "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar- Noncompliant, për dilatim stenti me presion të lartë dhe postdilatim, me dy marker, në interval gjatësie së paku 6mm deri 30 mm, në interval diametri 2.0mm - 4.0mm si dhe me presion mesatar të kapacitetit mbi 27atm, kompatibil per "kissing" balon teknik për Guiding catheter	0	1
145	Balloon Catheter koronar- Noncompliant, për dilatim stenti me presion të lartë dhe postdilatim, me dy marker, në interval gjatësie së paku 6mm deri 30 mm, në interval diametri 2.0mm - 4.0mm si dhe me presion mesatar të kapacitetit mbi 27atm, kompatibil per "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar- Noncompliant, për dilatim stenti me presion të lartë dhe postdilatim, me dy marker, në interval gjatësie së paku 6mm deri 30 mm, në interval diametri 2.0mm - 4.0mm si dhe me presion mesatar të kapacitetit mbi 27atm, kompatibil per "kissing" balon teknik për Guiding catheter	0	34
146	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se 0.017" (për lezione të komplikuara) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se 0.017" (për lezione të komplikuara) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	0	1

147	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se 0.017" (për lezione të komplikuara) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se 0.017" (për lezione të komplikuara) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	0	2
148	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se 0.017" (për lezione të komplikuara) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se 0.017" (për lezione të komplikuara) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	0	2
149	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se 0.017" (për lezione të komplikuara) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se 0.017" (për lezione të komplikuara) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	0	4

150	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se 0.017" (për leziona të komplikuara) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se 0.017" (për leziona të komplikuara) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	0	13
151	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se 0.017" (për leziona të komplikuara) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se 0.017" (për leziona të komplikuara) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	0	4
152	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se 0.017" (për leziona të komplikuara) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se 0.017" (për leziona të komplikuara) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	0	10

153	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se 0.017" (për lezione të komplikuara) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se 0.017" (për lezione të komplikuara) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	0	2
154	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se 0.017" (për lezione të komplikuara) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se 0.017" (për lezione të komplikuara) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	0	3
155	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se 0.017" (për lezione të komplikuara) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se 0.017" (për lezione të komplikuara) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	0	35

156	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se 0.017" (për leziona të komplikuara) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se 0.017" (për leziona të komplikuara) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	0	13
157	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se 0.017" (për leziona të komplikuara) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se 0.017" (për leziona të komplikuara) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	0	2
158	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se 0.017" (për leziona të komplikuara) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se 0.017" (për leziona të komplikuara) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	0	3

159	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se 0.017" (për leziona të komplikuara) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se 0.017" (për leziona të komplikuara) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	0	5
160	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se 0.017" (për leziona të komplikuara) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se 0.017" (për leziona të komplikuara) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	0	25
161	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se 0.017" (për leziona të komplikuara) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se 0.017" (për leziona të komplikuara) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	0	8

162	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se 0.017" (për leziona të komplikuara) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se 0.017" (për leziona të komplikuara) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	0	7
163	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se 0.017" (për leziona të komplikuara) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se 0.017" (për leziona të komplikuara) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	0	28
164	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se 0.017" (për leziona të komplikuara) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se 0.017" (për leziona të komplikuara) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	0	41

165	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se 0.017" (për leziona të komplikuara) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se 0.017" (për leziona të komplikuara) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	0	34
166	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se 0.017" (për leziona të komplikuara) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se 0.017" (për leziona të komplikuara) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	0	23
167	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se 0.017" (për leziona të komplikuara) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se 0.017" (për leziona të komplikuara) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	0	21

168	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se 0.017" (për leziona të komplikuara) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se 0.017" (për leziona të komplikuara) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	0	57
169	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se 0.017" (për leziona të komplikuara) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se 0.017" (për leziona të komplikuara) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	0	3
170	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se 0.017" (për leziona të komplikuara) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se 0.017" (për leziona të komplikuara) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	0	10

171	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se 0.017" (për leziona të komplikuara) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se 0.017" (për leziona të komplikuara) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	0	33
172	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se 0.017" (për leziona të komplikuara) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se 0.017" (për leziona të komplikuara) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	0	23
173	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se 0.017" (për leziona të komplikuara) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se 0.017" (për leziona të komplikuara) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	0	41

174	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se 0.017" (për leziona të komplikuara) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se 0.017" (për leziona të komplikuara) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	0	45
175	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se 0.017" (për leziona të komplikuara) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se 0.017" (për leziona të komplikuara) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	0	4
176	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se 0.017" (për leziona të komplikuara) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se 0.017" (për leziona të komplikuara) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	0	16

177	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se 0.017" (për leziona të komplikuara) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se 0.017" (për leziona të komplikuara) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	0	10
178	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se 0.017" (për leziona të komplikuara) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se 0.017" (për leziona të komplikuara) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	0	13
179	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se 0.017" (për leziona të komplikuara) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se 0.017" (për leziona të komplikuara) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	0	21
180	Blade Surgical Knife	21	handle 4	0	71
181	Blade Surgical Knife	21	handle 4	0	96
182	Blade Surgical Knife	11	handle 4	0	761

183	Breathing System	//	(Anaesthesia adult Breathing Circuits) (22mm consisting Y-piece and elbow) Length from 160 to 180cm, edhe gypin shtese 22mm 80cm me balon 2L. Latex free	0	19
184	ceftriaxone	1000mg	//	1000mg	20
185	Chloropyramine hydrochloride	10mg	2mL	10mg/mL	34
186	Clopidogrel	75mg	75mg	75mg	2
187	Compress Gause Sterile 12	36 cm x 40 cm	0	0	1125
188	Compress Gause Sterile 12	36 cm x 40 cm	0	0	285
189	Coronary stent retriever koronar për Trombektomi Mekanike me marker nga materiali Platinum & Tungsten, me gjatësi operative 30-46mm, me diametër 4.0mm-6.0mm, teli shtyrës me material Nitinol, me 2-3 dritare hapëse (hapje të jashtme në strukturën e stentit për futjen e trombit brenda hapsirës së stentit) kompatibel me Mikrokartetër 0.21"-0.27".	Coronary stent retriever	Coronary stent retriever koronar për Trombektomi Mekanike me marker nga materiali Platinum & Tungsten, me gjatësi operative 30-46mm, me diametër 4.0mm-6.0mm, teli shtyrës me material Nitinol, me 2-3 dritare hapëse (hapje të jashtme në strukturën e stentit për futjen e trombit brenda hapsirës së stentit) kompatibel me Mikrokartetër 0.21"-0.27".	0	1

190	Coronary stent retriever koronar për Trombektomi Mekanike me marker nga materiali Platinum & Tungsten, me gjatësi operative 30-46mm, me diametër 4.0mm-6.0mm, teli shtyrës me material Nitinol, me 2-3 dritare hapëse (hapje të jashtme në strukturën e stentit për futjen e trombit brenda hapsirës së stentit) kompatibel me Mikrokatetër 0.21"-0.27".	Coronary stent retriever	Coronary stent retriever koronar për Trombektomi Mekanike me marker nga materiali Platinum & Tungsten, me gjatësi operative 30-46mm, me diametër 4.0mm-6.0mm, teli shtyrës me material Nitinol, me 2-3 dritare hapëse (hapje të jashtme në strukturën e stentit për futjen e trombit brenda hapsirës së stentit) kompatibel me Mikrokatetër 0.21"-0.27".	0	2
191	Cotton Wool,Hydrophilic Roll	500g	0	0	2
192	Covered stent	1.Përshkrimi i Pajisjes- Covered stent,per sanim të perforimit të enëve koronare, aneurizmave dhe fistulave.2.Specifikim i Teknik Minimal Stent i mbuluar për përdorim në arteriet koronare.	Stenti nga kobalt kromiumi apo çelik inox të klasës mjekësore.Shtresa mbuluese nga materiale biokompatibile(EPTFE,PTFEose poliurotani).Kompatibil me katetrin 5F. Pa prani të substancave citotoksike.Diameter të telit udhëheqës 0.014"dimensione.Diametra nga 2.5 - 4mm. Gjatësi nga 16-26mm. Presioni nominal i fryrjes 16-18 atm.	0	2

193	Covered stent	1.Përshkrimi i Pajisjes- Covered stent,per sanim të perforimit të enëve koronare, aneurizmave dhe fistulave.2.Specifikim i Teknik Minimal Stent i mbuluar për përdorim në arteriet koronare.	Stenti nga kobalt kromiumi apo çelik inox të klasës mjekësore.Shtresa mbuluese nga materiale biokompatibile(EPTFE,PTFEo se poliurotani).Kompatibil me katetrin 5F. Pa prani të substancave citotoksike.Diameter të telit udhëheqës 0.014"dimensione.Diametra nga 2.5 - 4mm. Gjatësi nga 16-26mm. Presioni nominal i fryrjes 16-18 atm.	0	1
194	Covered stent	1.Përshkrimi i Pajisjes- Covered stent,per sanim të perforimit të enëve koronare, aneurizmave dhe fistulave.2.Specifikim i Teknik Minimal Stent i mbuluar për përdorim në arteriet koronare.	Stenti nga kobalt kromiumi apo çelik inox të klasës mjekësore.Shtresa mbuluese nga materiale biokompatibile(EPTFE,PTFEo se poliurotani).Kompatibil me katetrin 5F. Pa prani të substancave citotoksike.Diameter të telit udhëheqës 0.014"dimensione.Diametra nga 2.5 - 4mm. Gjatësi nga 16-26mm. Presioni nominal i fryrjes 16-18 atm.	0	1

195	Covered stent	1.Përshkrimi i Pajisjes- Covered stent,per sanim të perforimit të enëve koronare, aneurizmave dhe fistulave.2.Specifikim i Teknik Minimal Stent i mbuluar për përdorim në arteriet koronare.	Stenti nga kobalt kromiumi apo çelik inox të klasës mjekësore.Shtresa mbuluese nga materiale biokompatibile(EPTFE,PTFEo se poliurotani).Kompatibil me katetrin 5F. Pa prani të substancave citotoksike.Diameter të telit udhëheqës 0.014"dimensione.Diametra nga 2.5 - 4mm. Gjatësi nga 16-26mm. Presioni nominal i fryrjes 16-18 atm.	0	1
196	Covered stent	1.Përshkrimi i Pajisjes- Covered stent,per sanim të perforimit të enëve koronare, aneurizmave dhe fistulave.2.Specifikim i Teknik Minimal Stent i mbuluar për përdorim në arteriet koronare.	Stenti nga kobalt kromiumi apo çelik inox të klasës mjekësore.Shtresa mbuluese nga materiale biokompatibile(EPTFE,PTFEo se poliurotani).Kompatibil me katetrin 5F. Pa prani të substancave citotoksike.Diameter të telit udhëheqës 0.014"dimensione.Diametra nga 2.5 - 4mm. Gjatësi nga 16-26mm. Presioni nominal i fryrjes 16-18 atm.	0	1

197	Covered stent	1.Përshkrimi i Pajisjes- Covered stent,per sanim të perforimit të enëve koronare, aneurizmave dhe fistulave.2.Specifikim i Teknik Minimal Stent i mbuluar për përdorim në arteriet koronare.	Stenti nga kobalt kromiumi apo çelik inox të klasës mjekësore.Shtresa mbuluese nga materiale biokompatibile(EPTFE,PTFEo se poliurotani).Kompatibil me katetrin 5F. Pa prani të substancave citotoksike.Diameter të telit udhëheqës 0.014"dimensione.Diametra nga 2.5 - 4mm. Gjatësi nga 16-26mm. Presioni nominal i fryrjes 16-18 atm.	0	2
198	Covered stent	1.Përshkrimi i Pajisjes- Covered stent,per sanim të perforimit të enëve koronare, aneurizmave dhe fistulave.2.Specifikim i Teknik Minimal Stent i mbuluar për përdorim në arteriet koronare.	Stenti nga kobalt kromiumi apo çelik inox të klasës mjekësore.Shtresa mbuluese nga materiale biokompatibile(EPTFE,PTFEo se poliurotani).Kompatibil me katetrin 5F. Pa prani të substancave citotoksike.Diameter të telit udhëheqës 0.014"dimensione.Diametra nga 2.5 - 4mm. Gjatësi nga 16-26mm. Presioni nominal i fryrjes 16-18 atm.	0	2

199	Covered stent	1.Përshkrimi i Pajisjes- Covered stent,per sanim të perforimit të enëve koronare, aneurizmave dhe fistulave.2.Specifikim i Teknik Minimal Stent i mbuluar për përdorim në arteriet koronare.	Stenti nga kobalt kromiumi apo çelik inox të klasës mjekësore.Shtresa mbuluese nga materiale biokompatibile(EPTFE,PTFEo se poliurotani).Kompatibil me katetrin 5F. Pa prani të substancave citotoksike.Diameter të telit udhëheqës 0.014"dimensione.Diametra nga 2.5 - 4mm. Gjatësi nga 16-26mm. Presioni nominal i fryrjes 16-18 atm.	0	1
200	Covered stent	1.Përshkrimi i Pajisjes- Covered stent,per sanim të perforimit të enëve koronare, aneurizmave dhe fistulave.2.Specifikim i Teknik Minimal Stent i mbuluar për përdorim në arteriet koronare.	Stenti nga kobalt kromiumi apo çelik inox të klasës mjekësore.Shtresa mbuluese nga materiale biokompatibile(EPTFE,PTFEo se poliurotani).Kompatibil me katetrin 5F. Pa prani të substancave citotoksike.Diameter të telit udhëheqës 0.014"dimensione.Diametra nga 2.5 - 4mm. Gjatësi nga 16-26mm. Presioni nominal i fryrjes 16-18 atm.	0	1
201	Dezinfektues per duar	500ml	sol/gel	0	14
202	Dobutamine	250mg	20ml	250mg/20ml	42
203	Dopamine hydrochloride	40mg	5ml	40mg/ml	7
204	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinum-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm deri se paku 38mm,dhe diameter nga 2.0 deri 5.0mm apo 5.5mm pa u shkurtuar, me shtrat te stentit 45-86um	//	//	0	2

205	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinum-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm deri se paku 38mm,dhe diameter nga 2.0 deri 5.0mm apo 5.5mm pa u shkurtuar, me shtrat te stentit 45-86um	//	//	0	1
206	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinum-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm deri se paku 38mm,dhe diameter nga 2.0 deri 5.0mm apo 5.5mm pa u shkurtuar, me shtrat te stentit 45-86um	//	//	0	11
207	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinum-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm deri se paku 38mm,dhe diameter nga 2.0 deri 5.0mm apo 5.5mm pa u shkurtuar, me shtrat te stentit 45-86um	//	//	0	1
208	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinum-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm deri se paku 38mm,dhe diameter nga 2.0 deri 5.0mm apo 5.5mm pa u shkurtuar, me shtrat te stentit 45-86um	//	//	0	13
209	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinum-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm deri se paku 38mm,dhe diameter nga 2.0 deri 5.0mm apo 5.5mm pa u shkurtuar, me shtrat te stentit 45-86um	//	//	0	9
210	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinum-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm deri se paku 38mm,dhe diameter nga 2.0 deri 5.0mm apo 5.5mm pa u shkurtuar, me shtrat te stentit 45-86um	//	//	0	9

211	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinum-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm deri se paku 38mm,dhe diameter nga 2.0 deri 5.0mm apo 5.5mm pa u shkurtuar, me shtrat te stentit 45-86um	//	//	0	4
212	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinum-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm deri se paku 38mm,dhe diameter nga 2.0 deri 5.0mm apo 5.5mm pa u shkurtuar, me shtrat te stentit 45-86um	//	//	0	5
213	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinum-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm deri se paku 38mm,dhe diameter nga 2.0 deri 5.0mm apo 5.5mm pa u shkurtuar, me shtrat te stentit 45-86um	//	//	0	1
214	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinum-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm deri se paku 38mm,dhe diameter nga 2.0 deri 5.0mm apo 5.5mm pa u shkurtuar, me shtrat te stentit 45-86um	//	//	0	6
215	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinum-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm deri se paku 38mm,dhe diameter nga 2.0 deri 5.0mm apo 5.5mm pa u shkurtuar, me shtrat te stentit 45-86um	//	//	0	6
216	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinum-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm deri se paku 38mm,dhe diameter nga 2.0 deri 5.0mm apo 5.5mm pa u shkurtuar, me shtrat te stentit 45-86um	//	//	0	1

217	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinum-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm deri se paku 38mm,dhe diameter nga 2.0 deri 5.0mm apo 5.5mm pa u shkurtuar, me shtrat te stentit 45-86um	//	//	0	5
218	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinum-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm deri se paku 38mm,dhe diameter nga 2.0 deri 5.0mm apo 5.5mm pa u shkurtuar, me shtrat te stentit 45-86um	//	//	0	10
219	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinum-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm deri se paku 38mm,dhe diameter nga 2.0 deri 5.0mm apo 5.5mm pa u shkurtuar, me shtrat te stentit 45-86um	//	//	0	1
220	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinum-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm deri se paku 38mm,dhe diameter nga 2.0 deri 5.0mm apo 5.5mm pa u shkurtuar, me shtrat te stentit 45-86um	//	//	0	9
221	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinum-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm deri se paku 38mm,dhe diameter nga 2.0 deri 5.0mm apo 5.5mm pa u shkurtuar, me shtrat te stentit 45-86um	//	//	0	3
222	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinum-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm deri se paku 38mm,dhe diameter nga 2.0 deri 5.0mm apo 5.5mm pa u shkurtuar, me shtrat te stentit 45-86um	//	//	0	3

223	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinum-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm deri se paku 38mm,dhe diameter nga 2.0 deri 5.0mm apo 5.5mm pa u shkurtuar, me shtrat te stentit 45-86um	//	//	0	5
224	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinum-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm deri se paku 38mm,dhe diameter nga 2.0 deri 5.0mm apo 5.5mm pa u shkurtuar, me shtrat te stentit 45-86um	//	//	0	10
225	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinum-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm deri se paku 38mm,dhe diameter nga 2.0 deri 5.0mm apo 5.5mm pa u shkurtuar, me shtrat te stentit 45-86um	//	//	0	2
226	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinum-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm deri se paku 38mm,dhe diameter nga 2.0 deri 5.0mm apo 5.5mm pa u shkurtuar, me shtrat te stentit 45-86um	//	//	0	1
227	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinum-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm deri se paku 38mm,dhe diameter nga 2.0 deri 5.0mm apo 5.5mm pa u shkurtuar, me shtrat te stentit 45-86um	//	//	0	4
228	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinum-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm deri se paku 38mm,dhe diameter nga 2.0 deri 5.0mm apo 5.5mm pa u shkurtuar, me shtrat te stentit 45-86um	//	//	0	10

229	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinum-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm deri se paku 38mm,dhe diameter nga 2.0 deri 5.0mm apo 5.5mm pa u shkurtuar, me shtrat te stentit 45-86um	//	//	0	1
230	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinum-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm deri se paku 38mm,dhe diameter nga 2.0 deri 5.0mm apo 5.5mm pa u shkurtuar, me shtrat te stentit 45-86um	//	//	0	6
231	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinum-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm deri se paku 38mm,dhe diameter nga 2.0 deri 5.0mm apo 5.5mm pa u shkurtuar, me shtrat te stentit 45-86um	//	//	0	2
232	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinum-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm deri se paku 38mm,dhe diameter nga 2.0 deri 5.0mm apo 5.5mm pa u shkurtuar, me shtrat te stentit 45-86um	//	//	0	5
233	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinum-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm deri se paku 38mm,dhe diameter nga 2.0 deri 5.0mm apo 5.5mm pa u shkurtuar, me shtrat te stentit 45-86um	//	//	0	11
234	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinum-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm deri se paku 38mm,dhe diameter nga 2.0 deri 5.0mm apo 5.5mm pa u shkurtuar, me shtrat te stentit 45-86um	//	//	0	8

235	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinum-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm deri se paku 38mm,dhe diameter nga 2.0 deri 5.0mm apo 5.5mm pa u shkurtuar, me shtrat te stentit 45-86um	//	//	0	3
236	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinum-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm deri se paku 38mm,dhe diameter nga 2.0 deri 5.0mm apo 5.5mm pa u shkurtuar, me shtrat te stentit 45-86um	//	//	0	4
237	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinum-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm deri se paku 38mm,dhe diameter nga 2.0 deri 5.0mm apo 5.5mm pa u shkurtuar, me shtrat te stentit 45-86um	//	//	0	8
238	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinum-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm deri se paku 38mm,dhe diameter nga 2.0 deri 5.0mm apo 5.5mm pa u shkurtuar, me shtrat te stentit 45-86um	//	//	0	2
239	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinum-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm deri se paku 38mm,dhe diameter nga 2.0 deri 5.0mm apo 5.5mm pa u shkurtuar, me shtrat te stentit 45-86um	//	//	0	8
240	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinum-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm deri se paku 38mm,dhe diameter nga 2.0 deri 5.0mm apo 5.5mm pa u shkurtuar, me shtrat te stentit 45-86um	//	//	0	4

241	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinum-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm deri se paku 38mm,dhe diameter nga 2.0 deri 5.0mm apo 5.5mm pa u shkurtuar, me shtrat te stentit 45-86um	//	//	0	3
242	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinum-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm deri se paku 38mm,dhe diameter nga 2.0 deri 5.0mm apo 5.5mm pa u shkurtuar, me shtrat te stentit 45-86um	//	//	0	1
243	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinum-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm deri se paku 38mm,dhe diameter nga 2.0 deri 5.0mm apo 5.5mm pa u shkurtuar, me shtrat te stentit 45-86um	//	//	0	2
244	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinum-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm deri se paku 38mm,dhe diameter nga 2.0 deri 5.0mm apo 5.5mm pa u shkurtuar, me shtrat te stentit 45-86um	//	//	0	8

245	Drug-Eluting Balloon – Non-Compliant (DEB NC)	Substanca aktive: Paclitaxel ose Sirolimus (formulim me përthithje të lartë në murin arterial) Dozimi i barnës: 2.0 – 3.0 µg/mm² Teknologjia e elutimit: Mbështjellje hidrofiliqe, pa polimer të përhershëm Lejohet përdorimi i mbartësve biologjikë si urea, butyryl-tri-hexyl citrate, shellac, etj. Materiali i balonës: Poliamiid ose material tjetër që mundëson presion të lartë dhe përçueshmëri optimale	Kompliance: Balonë non-compliant (preferuar) ose semi-compliant e përforcuar Presionet: Presioni nominal (NP) 11 bar Presioni maksimal (RBP): 16 bar (preferuar) Profil i hyrjes së sistemit: • 0.017" për balonën me diametër 3.0 mm Markues radiopak: Të paktën 2 Diametër: në 2.0 – 4.5 mm ose më shumë Gjatësi: 10 – 20 mm	0	4
-----	---	--	---	---	---

246	Drug-Eluting Balloon – Non-Compliant (DEB NC)	Substanca aktive: Paclitaxel ose Sirolimus (formulim me përthithje të lartë në murin arterial) Dozimi i barnës: 2.0 – 3.0 µg/mm² Teknologjia e elutimit: Mbështjellje hidrofiliqe, pa polimer të përhershëm Lejohet përdorimi i mbartësve biologjikë si urea, butyryl-tri-hexyl citrate, shellac, etj. Materiali i balonës: Poliamiid ose material tjetër që mundëson presion të lartë dhe përçueshmëri optimale	Kompliance: Balonë non-compliant (preferuar) ose semi-compliant e përforcuar Presionet: Presioni nominal (NP) 11 bar Presioni maksimal (RBP): 16 bar (preferuar) Profil i hyrjes së sistemit: • 0.017" për balonën me diametër 3.0 mm Markues radiopak: Të paktën 2 Diametër: në 2.0 – 4.5 mm ose më shumë Gjatësi: 10 – 20 mm	0	4
-----	---	--	---	---	---

247	Drug-Eluting Balloon – Non-Compliant (DEB NC)	Substanca aktive: Paclitaxel ose Sirolimus (formulim me përthithje të lartë në murin arterial) Dozimi i barnës: 2.0 – 3.0 µg/mm² Teknologjia e elutimit: Mbështjellje hidrofiliqe, pa polimer të përhershëm Lejohet përdorimi i mbartësve biologjikë si urea, butyryl-tri-hexyl citrate, shellac, etj. Materiali i balonës: Poliamiid ose material tjetër që mundëson presion të lartë dhe përçueshmëri optimale	Kompliance: Balonë non-compliant (preferuar) ose semi-compliant e përforcuar Presionet: Presioni nominal (NP) 11 bar Presioni maksimal (RBP): 16 bar (preferuar) Profil i hyrjes së sistemit: • 0.017" për balonën me diametër 3.0 mm Markues radiopak: Të paktën 2 Diametër: në 2.0 – 4.5 mm ose më shumë Gjatësi: 10 – 20 mm	0	4
-----	---	---	--	---	---

248	Drug-Eluting Balloon – Non-Compliant (DEB NC)	Substanca aktive: Paclitaxel ose Sirolimus (formulim me përthithje të lartë në murin arterial) Dozimi i barnës: 2.0 – 3.0 µg/mm² Teknologjia e elutimit: Mbështjellje hidrofiliqe, pa polimer të përhershëm Lejohet përdorimi i mbartësve biologjikë si urea, butyryl-tri-hexyl citrate, shellac, etj. Materiali i balonës: Poliamiid ose material tjetër që mundëson presion të lartë dhe përçueshmëri optimale	Kompliance: Balonë non-compliant (preferuar) ose semi-compliant e përforcuar Presionet: Presioni nominal (NP) 11 bar Presioni maksimal (RBP): 16 bar (preferuar) Profil i hyrjes së sistemit: • 0.017" për balonën me diametër 3.0 mm Markues radiopak: Të paktën 2 Diametër: në 2.0 – 4.5 mm ose më shumë Gjatësi: 10 – 20 mm	0	8
-----	---	--	---	---	---

249	Drug-Eluting Balloon – Non-Compliant (DEB NC)	Substanca aktive: Paclitaxel ose Sirolimus (formulim me përthithje të lartë në murin arterial) Dozimi i barnës: 2.0 – 3.0 µg/mm² Teknologjia e elutimit: Mbështjellje hidrofiliqe, pa polimer të përhershëm Lejohet përdorimi i mbartësve biologjikë si urea, butyryl-tri-hexyl citrate, shellac, etj. Materiali i balonës: Poliamiid ose material tjetër që mundëson presion të lartë dhe përçueshmëri optimale	Kompliance: Balonë non-compliant (preferuar) ose semi-compliant e përforcuar Presionet: Presioni nominal (NP) 11 bar Presioni maksimal (RBP): 16 bar (preferuar) Profil i hyrjes së sistemit: • 0.017" për balonën me diametër 3.0 mm Markues radiopak: Të paktën 2 Diametër: në 2.0 – 4.5 mm ose më shumë Gjatësi: 10 – 20 mm	0	8
-----	---	--	---	---	---

250	Drug-Eluting Balloon – Non-Compliant (DEB NC)	Substanca aktive: Paclitaxel ose Sirolimus (formulim me përthithje të lartë në murin arterial) Dozimi i barnës: 2.0 – 3.0 µg/mm² Teknologjia e elutimit: Mbështjellje hidrofiliqe, pa polimer të përhershëm Lejohet përdorimi i mbartësve biologjikë si urea, butyryl-tri-hexyl citrate, shellac, etj. Materiali i balonës: Poliamiid ose material tjetër që mundëson presion të lartë dhe përçueshmëri optimale	Kompliance: Balonë non-compliant (preferuar) ose semi-compliant e përforcuar Presionet: Presioni nominal (NP) 11 bar Presioni maksimal (RBP): 16 bar (preferuar) Profil i hyrjes së sistemit: • 0.017" për balonën me diametër 3.0 mm Markues radiopak: Të paktën 2 Diametër: në 2.0 – 4.5 mm ose më shumë Gjatësi: 10 – 20 mm	0	8
-----	---	--	---	---	---

251	Drug-Eluting Balloon – Non-Compliant (DEB NC)	Substanca aktive: Paclitaxel ose Sirolimus (formulim me përthithje të lartë në murin arterial) Dozimi i barnës: 2.0 – 3.0 µg/mm² Teknologjia e elutimit: Mbështjellje hidrofiliqe, pa polimer të përhershëm Lejohet përdorimi i mbartësve biologjikë si urea, butyryl-tri-hexyl citrate, shellac, etj. Materiali i balonës: Poliamiid ose material tjetër që mundëson presion të lartë dhe përçueshmëri optimale	Kompliance: Balonë non-compliant (preferuar) ose semi-compliant e përforcuar Presionet: Presioni nominal (NP) 11 bar Presioni maksimal (RBP): 16 bar (preferuar) Profil i hyrjes së sistemit: • 0.017" për balonën me diametër 3.0 mm Markues radiopak: Të paktën 2 Diametër: në 2.0 – 4.5 mm ose më shumë Gjatësi: 10 – 20 mm	0	8
-----	---	--	---	---	---

252	Drug-Eluting Balloon – Non-Compliant (DEB NC)	Substanca aktive: Paclitaxel ose Sirolimus (formulim me përthithje të lartë në murin arterial) Dozimi i barnës: 2.0 – 3.0 µg/mm² Teknologjia e elutimit: Mbështjellje hidrofiliqe, pa polimer të përhershëm Lejohet përdorimi i mbartësve biologjikë si urea, butyryl-tri-hexyl citrate, shellac, etj. Materiali i balonës: Poliamiid ose material tjetër që mundëson presion të lartë dhe përçueshmëri optimale	Kompliance: Balonë non-compliant (preferuar) ose semi-compliant e përforcuar Presionet: Presioni nominal (NP) 11 bar Presioni maksimal (RBP): 16 bar (preferuar) Profil i hyrjes së sistemit: • 0.017" për balonën me diametër 3.0 mm Markues radiopak: Të paktën 2 Diametër: në 2.0 – 4.5 mm ose më shumë Gjatësi: 10 – 20 mm	0	3
-----	---	---	--	---	---

253	Drug-Eluting Balloon – Non-Compliant (DEB NC)	Substanca aktive: Paclitaxel ose Sirolimus (formulim me përthithje të lartë në murin arterial) Dozimi i barnës: 2.0 – 3.0 µg/mm² Teknologjia e elutimit: Mbështjellje hidrofiliqe, pa polimer të përhershëm Lejohet përdorimi i mbartësve biologjikë si urea, butyryl-tri-hexyl citrate, shellac, etj. Materiali i balonës: Poliamiid ose material tjetër që mundëson presion të lartë dhe përçueshmëri optimale	Kompliance: Balonë non-compliant (preferuar) ose semi-compliant e përforcuar Presionet: Presioni nominal (NP) 11 bar Presioni maksimal (RBP): 16 bar (preferuar) Profil i hyrjes së sistemit: • 0.017" për balonën me diametër 3.0 mm Markues radiopak: Të paktën 2 Diametër: në 2.0 – 4.5 mm ose më shumë Gjatësi: 10 – 20 mm	0	8
-----	---	--	---	---	---

254	Drug-Eluting Balloon – Non-Compliant (DEB NC)	Substanca aktive: Paclitaxel ose Sirolimus (formulim me përthithje të lartë në murin arterial) Dozimi i barnës: 2.0 – 3.0 µg/mm² Teknologjia e elutimit: Mbështjellje hidrofiliqe, pa polimer të përhershëm Lejohet përdorimi i mbartësve biologjikë si urea, butyryl-tri-hexyl citrate, shellac, etj. Materiali i balonës: Poliamiid ose material tjetër që mundëson presion të lartë dhe përçueshmëri optimale	Kompliance: Balonë non-compliant (preferuar) ose semi-compliant e përforcuar Presionet: Presioni nominal (NP) 11 bar Presioni maksimal (RBP): 16 bar (preferuar) Profil i hyrjes së sistemit: • 0.017" për balonën me diametër 3.0 mm Markues radiopak: Të paktën 2 Diametër: në 2.0 – 4.5 mm ose më shumë Gjatësi: 10 – 20 mm	0	4
-----	---	---	--	---	---

255	Drug-Eluting Balloon – Non-Compliant (DEB NC)	Substanca aktive: Paclitaxel ose Sirolimus (formulim me përthithje të lartë në murin arterial) Dozimi i barnës: 2.0 – 3.0 µg/mm² Teknologjia e elutimit: Mbështjellje hidrofiliqe, pa polimer të përhershëm Lejohet përdorimi i mbartësve biologjikë si urea, butyryl-tri-hexyl citrate, shellac, etj. Materiali i balonës: Poliamiid ose material tjetër që mundëson presion të lartë dhe përçueshmëri optimale	Kompliance: Balonë non-compliant (preferuar) ose semi-compliant e përforcuar Presionet: Presioni nominal (NP) 11 bar Presioni maksimal (RBP): 16 bar (preferuar) Profil i hyrjes së sistemit: • 0.017" për balonën me diametër 3.0 mm Markues radiopak: Të paktën 2 Diametër: në 2.0 – 4.5 mm ose më shumë Gjatësi: 10 – 20 mm	0	8
-----	---	--	---	---	---

256	Drug-Eluting Balloon – Non-Compliant (DEB NC)	Substanca aktive: Paclitaxel ose Sirolimus (formulim me përthithje të lartë në murin arterial) Dozimi i barnës: 2.0 – 3.0 µg/mm² Teknologjia e elutimit: Mbështjellje hidrofiliqe, pa polimer të përhershëm Lejohet përdorimi i mbartësve biologjikë si urea, butyryl-tri-hexyl citrate, shellac, etj. Materiali i balonës: Poliamiid ose material tjetër që mundëson presion të lartë dhe përçueshmëri optimale	Kompliance: Balonë non-compliant (preferuar) ose semi-compliant e përforcuar Presionet: Presioni nominal (NP) 11 bar Presioni maksimal (RBP): 16 bar (preferuar) Profil i hyrjes së sistemit: • 0.017" për balonën me diametër 3.0 mm Markues radiopak: Të paktën 2 Diametër: në 2.0 – 4.5 mm ose më shumë Gjatësi: 10 – 20 mm	0	4
-----	---	--	---	---	---

257	Drug-Eluting Balloon – Non-Compliant (DEB NC)	Substanca aktive: Paclitaxel ose Sirolimus (formulim me përthithje të lartë në murin arterial) Dozimi i barnës: 2.0 – 3.0 µg/mm² Teknologjia e elutimit: Mbështjellje hidrofiliqe, pa polimer të përhershëm Lejohet përdorimi i mbartësve biologjikë si urea, butyryl-tri-hexyl citrate, shellac, etj. Materiali i balonës: Poliamiid ose material tjetër që mundëson presion të lartë dhe përçueshmëri optimale	Kompliance: Balonë non-compliant (preferuar) ose semi-compliant e përforcuar Presionet: Presioni nominal (NP) 11 bar Presioni maksimal (RBP): 16 bar (preferuar) Profil i hyrjes së sistemit: • 0.017" për balonën me diametër 3.0 mm Markues radiopak: Të paktën 2 Diametër: në 2.0 – 4.5 mm ose më shumë Gjatësi: 10 – 20 mm	0	3
-----	---	--	---	---	---

258	Drug-Eluting Balloon – Non-Compliant (DEB NC)	Substanca aktive: Paclitaxel ose Sirolimus (formulim me përthithje të lartë në murin arterial) Dozimi i barnës: 2.0 – 3.0 µg/mm² Teknologjia e elutimit: Mbështjellje hidrofiliqe, pa polimer të përhershëm Lejohet përdorimi i mbartësve biologjikë si urea, butyryl-tri-hexyl citrate, shellac, etj. Materiali i balonës: Poliamiid ose material tjetër që mundëson presion të lartë dhe përçueshmëri optimale	Kompliance: Balonë non-compliant (preferuar) ose semi-compliant e përforcuar Presionet: Presioni nominal (NP) 11 bar Presioni maksimal (RBP): 16 bar (preferuar) Profil i hyrjes së sistemit: • 0.017" për balonën me diametër 3.0 mm Markues radiopak: Të paktën 2 Diametër: në 2.0 – 4.5 mm ose më shumë Gjatësi: 10 – 20 mm	0	8
-----	---	--	---	---	---

259	Drug-Eluting Balloon – Non-Compliant (DEB NC)	Substanca aktive: Paclitaxel ose Sirolimus (formulim me përthithje të lartë në murin arterial) Dozimi i barnës: 2.0 – 3.0 µg/mm² Teknologjia e elutimit: Mbështjellje hidrofiliqe, pa polimer të përhershëm Lejohet përdorimi i mbartësve biologjikë si urea, butyryl-tri-hexyl citrate, shellac, etj. Materiali i balonës: Poliamiid ose material tjetër që mundëson presion të lartë dhe përçueshmëri optimale	Kompliance: Balonë non-compliant (preferuar) ose semi-compliant e përforcuar Presionet: Presioni nominal (NP) 11 bar Presioni maksimal (RBP): 16 bar (preferuar) Profil i hyrjes së sistemit: • 0.017" për balonën me diametër 3.0 mm Markues radiopak: Të paktën 2 Diametër: në 2.0 – 4.5 mm ose më shumë Gjatësi: 10 – 20 mm	0	6
-----	---	--	---	---	---

260	Drug-Eluting Balloon – Non-Compliant (DEB NC)	Substanca aktive: Paclitaxel ose Sirolimus (formulim me përthithje të lartë në murin arterial) Dozimi i barnës: 2.0 – 3.0 µg/mm² Teknologjia e elutimit: Mbështjellje hidrofiliqe, pa polimer të përhershëm Lejohet përdorimi i mbartësve biologjikë si urea, butyryl-tri-hexyl citrate, shellac, etj. Materiali i balonës: Poliamiid ose material tjetër që mundëson presion të lartë dhe përçueshmëri optimale	Kompliance: Balonë non-compliant (preferuar) ose semi-compliant e përforcuar Presionet: Presioni nominal (NP) 11 bar Presioni maksimal (RBP): 16 bar (preferuar) Profil i hyrjes së sistemit: • 0.017" për balonën me diametër 3.0 mm Markues radiopak: Të paktën 2 Diametër: në 2.0 – 4.5 mm ose më shumë Gjatësi: 10 – 20 mm	0	8
-----	---	--	---	---	---

261	Drug-Eluting Balloon – Non-Compliant (DEB NC)	Substanca aktive: Paclitaxel ose Sirolimus (formulim me përthithje të lartë në murin arterial) Dozimi i barnës: 2.0 – 3.0 µg/mm² Teknologjia e elutimit: Mbështjellje hidrofiliqe, pa polimer të përhershëm Lejohet përdorimi i mbartësve biologjikë si urea, butyryl-tri-hexyl citrate, shellac, etj. Materiali i balonës: Poliamiid ose material tjetër që mundëson presion të lartë dhe përçueshmëri optimale	Kompliance: Balonë non-compliant (preferuar) ose semi-compliant e përforcuar Presionet: Presioni nominal (NP) 11 bar Presioni maksimal (RBP): 16 bar (preferuar) Profil i hyrjes së sistemit: • 0.017" për balonën me diametër 3.0 mm Markues radiopak: Të paktën 2 Diametër: në 2.0 – 4.5 mm ose më shumë Gjatësi: 10 – 20 mm	0	3
-----	---	--	---	---	---

262	Drug-Eluting Balloon – Non-Compliant (DEB NC)	Substanca aktive: Paclitaxel ose Sirolimus (formulim me përthithje të lartë në murin arterial) Dozimi i barnës: 2.0 – 3.0 µg/mm² Teknologjia e elutimit: Mbështjellje hidrofiliqe, pa polimer të përhershëm Lejohet përdorimi i mbartësve biologjikë si urea, butyryl-tri-hexyl citrate, shellac, etj. Materiali i balonës: Poliamiid ose material tjetër që mundëson presion të lartë dhe përçueshmëri optimale	Kompliance: Balonë non-compliant (preferuar) ose semi-compliant e përforcuar Presionet: Presioni nominal (NP) 11 bar Presioni maksimal (RBP): 16 bar (preferuar) Profil i hyrjes së sistemit: • 0.017" për balonën me diametër 3.0 mm Markues radiopak: Të paktën 2 Diametër: në 2.0 – 4.5 mm ose më shumë Gjatësi: 10 – 20 mm	0	8
-----	---	--	---	---	---

263	Drug-Eluting Balloon – Non-Compliant (DEB NC)	Substanca aktive: Paclitaxel ose Sirolimus (formulim me përthithje të lartë në murin arterial) Dozimi i barnës: 2.0 – 3.0 µg/mm² Teknologjia e elutimit: Mbështjellje hidrofiliqe, pa polimer të përhershëm Lejohet përdorimi i mbartësve biologjikë si urea, butyryl-tri-hexyl citrate, shellac, etj. Materiali i balonës: Poliamiid ose material tjetër që mundëson presion të lartë dhe përçueshmëri optimale	Kompliance: Balonë non-compliant (preferuar) ose semi-compliant e përforcuar Presionet: Presioni nominal (NP) 11 bar Presioni maksimal (RBP): 16 bar (preferuar) Profil i hyrjes së sistemit: • 0.017" për balonën me diametër 3.0 mm Markues radiopak: Të paktën 2 Diametër: në 2.0 – 4.5 mm ose më shumë Gjatësi: 10 – 20 mm	0	2
-----	---	--	---	---	---

264	Drug-Eluting Balloon – Non-Compliant (DEB NC)	Substanca aktive: Paclitaxel ose Sirolimus (formulim me përthithje të lartë në murin arterial) Dozimi i barnës: 2.0 – 3.0 µg/mm² Teknologjia e elutimit: Mbështjellje hidrofiliqe, pa polimer të përhershëm Lejohet përdorimi i mbartësve biologjikë si urea, butyryl-tri-hexyl citrate, shellac, etj. Materiali i balonës: Poliamiid ose material tjetër që mundëson presion të lartë dhe përçueshmëri optimale	Kompliance: Balonë non-compliant (preferuar) ose semi-compliant e përforcuar Presionet: Presioni nominal (NP) 11 bar Presioni maksimal (RBP): 16 bar (preferuar) Profil i hyrjes së sistemit: • 0.017" për balonën me diametër 3.0 mm Markues radiopak: Të paktën 2 Diametër: në 2.0 – 4.5 mm ose më shumë Gjatësi: 10 – 20 mm	0	5
-----	---	---	--	---	---

265	Drug-Eluting Balloon – Non-Compliant (DEB NC)	Substanca aktive: Paclitaxel ose Sirolimus (formulim me përthithje të lartë në murin arterial) Dozimi i barnës: 2.0 – 3.0 µg/mm² Teknologjia e elutimit: Mbështjellje hidrofiliqe, pa polimer të përhershëm Lejohet përdorimi i mbartësve biologjikë si urea, butyryl-tri-hexyl citrate, shellac, etj. Materiali i balonës: Poliamiid ose material tjetër që mundëson presion të lartë dhe përçueshmëri optimale	Kompliance: Balonë non-compliant (preferuar) ose semi-compliant e përforcuar Presionet: Presioni nominal (NP) 11 bar Presioni maksimal (RBP): 16 bar (preferuar) Profil i hyrjes së sistemit: • 0.017" për balonën me diametër 3.0 mm Markues radiopak: Të paktën 2 Diametër: në 2.0 – 4.5 mm ose më shumë Gjatësi: 10 – 20 mm	0	3
-----	---	--	---	---	---

266	Drug-Eluting Balloon – Non-Compliant (DEB NC)	Substanca aktive: Paclitaxel ose Sirolimus (formulim me përthithje të lartë në murin arterial) Dozimi i barnës: 2.0 – 3.0 µg/mm² Teknologjia e elutimit: Mbështjellje hidrofiliqe, pa polimer të përhershëm Lejohet përdorimi i mbartësve biologjikë si urea, butyryl-tri-hexyl citrate, shellac, etj. Materiali i balonës: Poliamiid ose material tjetër që mundëson presion të lartë dhe përçueshmëri optimale	Kompliance: Balonë non-compliant (preferuar) ose semi-compliant e përforcuar Presionet: Presioni nominal (NP) 11 bar Presioni maksimal (RBP): 16 bar (preferuar) Profil i hyrjes së sistemit: • 0.017" për balonën me diametër 3.0 mm Markues radiopak: Të paktën 2 Diametër: në 2.0 – 4.5 mm ose më shumë Gjatësi: 10 – 20 mm	0	3
-----	---	--	---	---	---

267	DrugElutingBalloon – SemiCompliant (DEB SC)	SemiCompliant (DEB SC) Përdorimi klinik:Pajisje për trajtimin e:Lezioneve të reja aterosklerotikeRestenozës në stentë të vendosur më parë (BMS/DES)Enëve të vogla (small vessel disease)Rastet akute të stenozës koronareKarakteristikat teknike të kërkuara:Teknologjia e mbështjelljes së balonës:Bari aktive:	sipas kontrates	0	4
268	DrugElutingBalloon – SemiCompliant (DEB SC)	SemiCompliant (DEB SC) Përdorimi klinik:Pajisje për trajtimin e:Lezioneve të reja aterosklerotikeRestenozës në stentë të vendosur më parë (BMS/DES)Enëve të vogla (small vessel disease)Rastet akute të stenozës koronareKarakteristikat teknike të kërkuara:Teknologjia e mbështjelljes së balonës:Bari aktive:	sipas kontrates	0	1

269	DrugElutingBalloon – SemiCompliant (DEB SC)	SemiCompliant (DEB SC) Përdorimi klinik:Pajisje për trajtimin e:Lezioneve të reja aterosklerotikeRestenozës në stentë të vendosur më parë (BMS/DES)Enëve të vogla (small vessel disease)Rastet akute të stenozës koronareKarakteristikat teknike të kërkuara:Teknologjia e mbështjelljes së balonës:Bari aktive:	sipas kontrates	0	10
270	DrugElutingBalloon – SemiCompliant (DEB SC)	SemiCompliant (DEB SC) Përdorimi klinik:Pajisje për trajtimin e:Lezioneve të reja aterosklerotikeRestenozës në stentë të vendosur më parë (BMS/DES)Enëve të vogla (small vessel disease)Rastet akute të stenozës koronareKarakteristikat teknike të kërkuara:Teknologjia e mbështjelljes së balonës:Bari aktive:	sipas kontrates	0	3

271	DrugElutingBalloon – SemiCompliant (DEB SC)	SemiCompliant (DEB SC) Përdorimi klinik:Pajisje për trajtimin e:Lezioneve të reja aterosklerotikeRestenozës në stentë të vendosur më parë (BMS/DES)Enëve të vogla (small vessel disease)Rastet akute të stenozës koronareKarakteristikat teknike të kërkuara:Teknologjia e mbështjelljes së balonës:Bari aktive:	sipas kontrates	0	1
272	DrugElutingBalloon – SemiCompliant (DEB SC)	SemiCompliant (DEB SC) Përdorimi klinik:Pajisje për trajtimin e:Lezioneve të reja aterosklerotikeRestenozës në stentë të vendosur më parë (BMS/DES)Enëve të vogla (small vessel disease)Rastet akute të stenozës koronareKarakteristikat teknike të kërkuara:Teknologjia e mbështjelljes së balonës:Bari aktive:	sipas kontrates	0	1

273	DrugElutingBalloon – SemiCompliant (DEB SC)	SemiCompliant (DEB SC) Përdorimi klinik:Pajisje për trajtimin e:Lezioneve të reja aterosklerotikeRestenozës në stentë të vendosur më parë (BMS/DES)Enëve të vogla (small vessel disease)Rastet akute të stenozës koronareKarakteristikat teknike të kërkuara:Teknologjia e mbështjelljes së balonës:Bari aktive:	sipas kontrates	0	5
274	DrugElutingBalloon – SemiCompliant (DEB SC)	SemiCompliant (DEB SC) Përdorimi klinik:Pajisje për trajtimin e:Lezioneve të reja aterosklerotikeRestenozës në stentë të vendosur më parë (BMS/DES)Enëve të vogla (small vessel disease)Rastet akute të stenozës koronareKarakteristikat teknike të kërkuara:Teknologjia e mbështjelljes së balonës:Bari aktive:	sipas kontrates	0	10

275	DrugElutingBalloon – SemiCompliant (DEB SC)	SemiCompliant (DEB SC) Përdorimi klinik:Pajisje për trajtimin e:Lezioneve të reja aterosklerotikeRestenozës në stentë të vendosur më parë (BMS/DES)Enëve të vogla (small vessel disease)Rastet akute të stenozës koronareKarakteristikat teknike të kërkuara:Teknologjia e mbështjelljes së balonës:Bari aktive:	sipas kontrates	0	1
276	DrugElutingBalloon – SemiCompliant (DEB SC)	SemiCompliant (DEB SC) Përdorimi klinik:Pajisje për trajtimin e:Lezioneve të reja aterosklerotikeRestenozës në stentë të vendosur më parë (BMS/DES)Enëve të vogla (small vessel disease)Rastet akute të stenozës koronareKarakteristikat teknike të kërkuara:Teknologjia e mbështjelljes së balonës:Bari aktive:	sipas kontrates	0	2

277	DrugElutingBalloon – SemiCompliant (DEB SC)	SemiCompliant (DEB SC) Përdorimi klinik:Pajisje për trajtimin e:Lezioneve të reja aterosklerotikeRestenozës në stentë të vendosur më parë (BMS/DES)Enëve të vogla (small vessel disease)Rastet akute të stenoze koronareKarakteristikat teknike të kërkuara:Teknologjia e mbështjelljes së balonës:Bari aktive:	sipas kontrates	0	10
278	DrugElutingBalloon – SemiCompliant (DEB SC)	SemiCompliant (DEB SC) Përdorimi klinik:Pajisje për trajtimin e:Lezioneve të reja aterosklerotikeRestenozës në stentë të vendosur më parë (BMS/DES)Enëve të vogla (small vessel disease)Rastet akute të stenoze koronareKarakteristikat teknike të kërkuara:Teknologjia e mbështjelljes së balonës:Bari aktive:	sipas kontrates	0	3

279	DrugElutingBalloon – SemiCompliant (DEB SC)	SemiCompliant (DEB SC) Përdorimi klinik:Pajisje për trajtimin e:Lezioneve të reja aterosklerotikeRestenozës në stentë të vendosur më parë (BMS/DES)Enëve të vogla (small vessel disease)Rastet akute të stenozës koronareKarakteristikat teknike të kërkuara:Teknologjia e mbështjelljes së balonës:Bari aktive:	sipas kontrates	0	10
280	DrugElutingBalloon – SemiCompliant (DEB SC)	SemiCompliant (DEB SC) Përdorimi klinik:Pajisje për trajtimin e:Lezioneve të reja aterosklerotikeRestenozës në stentë të vendosur më parë (BMS/DES)Enëve të vogla (small vessel disease)Rastet akute të stenozës koronareKarakteristikat teknike të kërkuara:Teknologjia e mbështjelljes së balonës:Bari aktive:	sipas kontrates	0	3

281	DrugElutingBalloon – SemiCompliant (DEB SC)	SemiCompliant (DEB SC) Përdorimi klinik:Pajisje për trajtimin e:Lezioneve të reja aterosklerotikeRestenozës në stentë të vendosur më parë (BMS/DES)Enëve të vogla (small vessel disease)Rastet akute të steno­zës koronareKarakteristikat teknike të kërkuara:Teknologjia e mbështjelljes së balonës:Bari aktive:	sipas kontrates	0	2
282	DrugElutingBalloon – SemiCompliant (DEB SC)	SemiCompliant (DEB SC) Përdorimi klinik:Pajisje për trajtimin e:Lezioneve të reja aterosklerotikeRestenozës në stentë të vendosur më parë (BMS/DES)Enëve të vogla (small vessel disease)Rastet akute të steno­zës koronareKarakteristikat teknike të kërkuara:Teknologjia e mbështjelljes së balonës:Bari aktive:	sipas kontrates	0	3

283	DrugElutingBalloon – SemiCompliant (DEB SC)	SemiCompliant (DEB SC) Përdorimi klinik:Pajisje për trajtimin e:Lezioneve të reja aterosklerotikeRestenozës në stentë të vendosur më parë (BMS/DES)Enëve të vogla (small vessel disease)Rastet akute të stenoze koronareKarakteristikat teknike të kërkuara:Teknologjia e mbështjelljes së balonës:Bari aktive:	sipas kontrates	0	2
284	DrugElutingBalloon – SemiCompliant (DEB SC)	SemiCompliant (DEB SC) Përdorimi klinik:Pajisje për trajtimin e:Lezioneve të reja aterosklerotikeRestenozës në stentë të vendosur më parë (BMS/DES)Enëve të vogla (small vessel disease)Rastet akute të stenoze koronareKarakteristikat teknike të kërkuara:Teknologjia e mbështjelljes së balonës:Bari aktive:	sipas kontrates	0	1

285	DrugElutingBalloon – SemiCompliant (DEB SC)	SemiCompliant (DEB SC) Përdorimi klinik:Pajisje për trajtimin e:Lezioneve të reja aterosklerotikeRestenozës në stentë të vendosur më parë (BMS/DES)Enëve të vogla (small vessel disease)Rastet akute të stenozës koronareKarakteristikat teknike të kërkuara:Teknologjia e mbështjelljes së balonës:Bari aktive:	sipas kontrates	0	3
286	DrugElutingBalloon – SemiCompliant (DEB SC)	SemiCompliant (DEB SC) Përdorimi klinik:Pajisje për trajtimin e:Lezioneve të reja aterosklerotikeRestenozës në stentë të vendosur më parë (BMS/DES)Enëve të vogla (small vessel disease)Rastet akute të stenozës koronareKarakteristikat teknike të kërkuara:Teknologjia e mbështjelljes së balonës:Bari aktive:	sipas kontrates	0	3

287	DrugElutingBalloon – SemiCompliant (DEB SC)	SemiCompliant (DEB SC) Përdorimi klinik:Pajisje për trajtimin e:Lezioneve të reja aterosklerotikeRestenozës në stentë të vendosur më parë (BMS/DES)Enëve të vogla (small vessel disease)Rastet akute të stenozeve koronareKarakteristikat teknike të kërkuara:Teknologjia e mbështjelljes së balonës:Bari aktive:	sipas kontrates	0	10
288	DrugElutingBalloon – SemiCompliant (DEB SC)	SemiCompliant (DEB SC) Përdorimi klinik:Pajisje për trajtimin e:Lezioneve të reja aterosklerotikeRestenozës në stentë të vendosur më parë (BMS/DES)Enëve të vogla (small vessel disease)Rastet akute të stenozeve koronareKarakteristikat teknike të kërkuara:Teknologjia e mbështjelljes së balonës:Bari aktive:	sipas kontrates	0	1

289	DrugElutingBalloon – SemiCompliant (DEB SC)	SemiCompliant (DEB SC) Përdorimi klinik:Pajisje për trajtimin e:Lezioneve të reja aterosklerotikeRestenozës në stentë të vendosur më parë (BMS/DES)Enëve të vogla (small vessel disease)Rastet akute të stenozës koronareKarakteristikat teknike të kërkuara:Teknologjia e mbështjelljes së balonës:Bari aktive:	sipas kontrates	0	10
290	DrugElutingBalloon – SemiCompliant (DEB SC)	SemiCompliant (DEB SC) Përdorimi klinik:Pajisje për trajtimin e:Lezioneve të reja aterosklerotikeRestenozës në stentë të vendosur më parë (BMS/DES)Enëve të vogla (small vessel disease)Rastet akute të stenozës koronareKarakteristikat teknike të kërkuara:Teknologjia e mbështjelljes së balonës:Bari aktive:	sipas kontrates	0	1
291	Elektroda për EKG	//	//	0	1389
292	Elektroda për EKG	//	//	0	1800

293	Endotracheal Tube With Cuff Oral	7.5	//	0	20
294	Endotracheal Tube With Cuff Oral	8	//	0	1
295	Foley Catheter	18 FG	cope	0	44
296	Foley Catheter	16 FG	cope	0	20
297	Foley Catheter	18 FG	cope	0	20
298	Foley Catheter	16 FG	cope	0	48
299	Furosemide	10mg	2ml	10mg/ml	68
300	Gloves examination	Large	0	0	1600
301	Gloves surgical steriles pair latex	7.5	0	0	183
302	Gloves surgical steriles pair latex	6.5	0	0	27
303	Gown Surgical Sterile Disposable	Large	0	0	60
304	Gown Surgical Sterile Disposable	Large	0	0	45
305	Guedel Airway	n° 3	cope	0	20
306	Guiding catheter	6 F	JR 4.0	0	10
307	Guiding catheter	6 F	JR 4.0	0	9
308	Guiding catheter	6 F	JL 4.0	0	129
309	Guiding catheter	6 F	JR 4.0	0	8
310	Guiding catheter	6 F	JL 4.0	0	18
311	Guiding catheter	6 F	JR 4.0	0	77
312	Guiding catheter	6 F	JR 4.0	0	5
313	Guiding catheter	6 F	JL 4.0	0	5
314	Guiding catheter	6 F	JL 4.0	0	1
315	Guiding catheter 6F, 7F, 8F Kateter per Intervenime komplekse per Angiografi koronare nga materiali me polimer unike qe rrite qendrushmerin ndaj forces dhe mundeson qendrushmerin e kurbes me lumen te gjere i pajtushem me pajisjet intervente per trajtim me rrjedhje te avansuar dhe vizualizim me te mire me tipe dhe lakesa;AL:0.75,1.0,1.5,2.0,3.0;AR;1.0,2.0,EBU:3.0,3.25,3.5,3.75,4.0,4.5,5.0;RBU:3.5,4.0; MP:1.0,2.0;RCB:IMA; Hockey stick: I,II,III; Champ;MAC;NOTO;ELGAMAL 3DRIGHT, me variante me dhe pa side holes per casje femorale dhe radiale te gjitha konfigurimet.	//	//	0	25

316	Guiding catheter 6F, 7F, 8F Kateter per Intervenime komplekse per Angiografi koronare nga materiali me polimer unike qe rrite qendrushmerin ndaj forces dhe mundeson qendrushmerin e kurbes me lumen te gjere i pajtushem me pajisjet intervente per trajtim me rrjedhje te avansuar dhe vizualizim me te mire me tipe dhe lakesa;AL:0.75,1.0,1.5,2.0,3.0;AR;1.0,2.0,EBU:3.0,3.25,3.5,3.75,4.0,4.5,5.0;RBU:3.5,4.0; MP:1.0,2.0;RCB:IMA; Hockey stick: I,II,III; Champ;MAC;NOTO;ELGAMAL 3DRIGHT, me variante me dhe pa side holes per casje femorale dhe radiale te gjitha konfigurimet.	//	//	0	28
317	Heparin natrium	25000 iu 5ml	25000 iu 5ml	25000 iu 5ml	47
318	Heparin natrium	25000 iu 5ml	25000 iu 5ml	25000 iu 5ml	645
319	I.V. Placement Unit, Short , Luer Type Disposable	20 G, 1.1 x 32 mm	0	0	294
320	I.V. Placement Unit, Short , Luer Type Disposable	22 G, 0.8 x 25 mm	0	0	48
321	I.V. Placement Unit, Short , Luer Type Disposable	22 G, 0.8 x 25 mm	0	0	2
322	I.V. Placement Unit, Short , Luer Type Disposable	18 G, 1.3 x 45 mm	0	0	162
323	Infusion Giving Set	0	0	0	2289
324	Intervention Guidewire Hidrofil për PCI	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për telin intervenues (Intervention Guidewire) të përdorur në ndërhyrje koronare (PCI), i dizajnuar për kalim të lezioneve stenotike dhe komplekse.	1. Specifikacioni Teknik • Lloji i produktit: Intervention Guidewire hidrofil për PCI • Dizajni: Core-to-tip – lidhje direkte e bërthamës me majën • Diametri i telit: 0.008-0.014" (inch) • Gjatësia totale: 145 – 300 cm • Materiali i bërthamës: Çelik inox – DurasteelStainless ose Nitinol • Mbështjellje: Polimer i plotë (full polymer jacket) • Veshje e jashtme: Hidrofilike, të paktën 6 cm në segmentin distal prej 16 cm	0	120

325	Intervention Guidewire me diameter 0.014 dhe me gjatesi 180-300 cm . Extra Support , me maje distale fleksibile për të reduktuar traumën e enëve të gjakut dhe ndihmon ne drejtimin e enëve të gjakut. Lloji i majes Spring Coil me peshe specifike 0.9g, nga materiali Stainles steel me mveshje hibride Hidrofilike, 3 cm radiopak	Intervention Guidewire	me diameter 0.014 dhe me gjatesi 180-300 cm . Extra Support , me maje distale fleksibile për të reduktuar traumën e enëve të gjakut dhe ndihmon ne drejtimin e enëve të gjakut. Lloji i majes Spring Coil me peshe specifike 0.9g, nga materiali Stainles steel me mveshje hibride Hidrofilike, 3 cm radiopak	0	114
326	Intervention Guidewire me diameter 0.014 dhe me gjatesi 180-300 cm . Extra Support , me maje distale fleksibile për të reduktuar traumën e enëve të gjakut dhe ndihmon ne drejtimin e enëve të gjakut. Lloji i majes Spring Coil me peshe specifike 0.9g, nga materiali Stainles steel me mveshje hibride Hidrofilike, 3 cm radiopak	Intervention Guidewire	me diameter 0.014 dhe me gjatesi 180-300 cm . Extra Support , me maje distale fleksibile për të reduktuar traumën e enëve të gjakut dhe ndihmon ne drejtimin e enëve të gjakut. Lloji i majes Spring Coil me peshe specifike 0.9g, nga materiali Stainles steel me mveshje hibride Hidrofilike, 3 cm radiopak	0	63
327	Katetera Diagnostik, të gjitha konfiguracionet e kateterave për Angjiografi, Ventrikulografi dhe Kateterizim të djathtë, me tipe dhe lakesa të ndryshme, me përbërje ndërmjet poliuretanit dhe najlonit, mjaftueshëm radiopake (Judkins, IM, Amplatz, Pigtail, Multipurpose, Sones dhe Brachial) 5-7 F, me gjatësi 100 deri 125 cm.	Katetera Diagnostik	Katetera Diagnostik, të gjitha konfiguracionet e kateterave për Angjiografi, Ventrikulografi dhe Kateterizim të djathtë, me tipe dhe lakesa të ndryshme, me përbërje ndërmjet poliuretanit dhe najlonit, mjaftueshëm radiopake (Judkins, IM, Amplatz, Pigtail, Multipurpose, Sones dhe Brachial) 5-7 F, me gjatësi 100 deri 125 cm.	0	127

328	Katetera Diagnostik, të gjitha konfiguracionet e kateterave për Angjiografi, Ventrikulografi dhe Kateterizim të djathtë, me tipe dhe lakesa të ndryshme, me përbërje ndërmjet poliuretanit dhe najlonit, mjaftueshëm radiopake (Judkins, IM, Amplatz, Pigtail, Multipurpose, Sones dhe Brachial) 5-7 F, me gjatësi 100 deri 125 cm.	Katetera Diagnostik	Katetera Diagnostik, të gjitha konfiguracionet e kateterave për Angjiografi, Ventrikulografi dhe Kateterizim të djathtë, me tipe dhe lakesa të ndryshme, me përbërje ndërmjet poliuretanit dhe najlonit, mjaftueshëm radiopake (Judkins, IM, Amplatz, Pigtail, Multipurpose, Sones dhe Brachial) 5-7 F, me gjatësi 100 deri 125 cm.	0	10
329	Kontrast jojonik jod/ml	350-400mg	deri 200ml	350-400mg	27950
330	Kontrast jojonik jod/ml	350-400mg	deri 200ml	350-400mg	12350
331	Lidocaine	2%	//	2%	973
332	Lidocaine	2%	//	2%	246
333	Lidocaine	2%	//	2%	5
334	MASK SURGICAL DISPOSABLE	0	0	0	47
335	Maska per oksigjen	për të rritur	//	0	20
336	methylprednisolone	40mg	1ml , 5ml	40mg/ml, (si suksinat natriumi) në flakon 1 mL monodozë dhe flakona 5-mL multi-dozë	13
337	Metoclopramide Hydrochloride	5mg	2ml	5mg/ml	83
338	Metoclopramide Hydrochloride	5mg	2ml	5 mg / ml	12
339	Natrium chloride	0.9%	500 ml	0.9% 500 ml izotonik (ekuivalent me Na+ 154 mmol/L, Cl- 154 mmol/L)	416
340	Natrium chloride	0.9%	500 ml	0.9% 500 ml izotonik (ekuivalent me Na+ 154 mmol/L, Cl- 154 mmol/L)	10
341	Natrium chloride	0.9%	500 ml	0.9% 500 ml izotonik (ekuivalent me Na+ 154 mmol/L, Cl- 154 mmol/L)	425
342	Natrium chloride	0.9%	500 ml	0.9% 500 ml izotonik (ekuivalent me Na+ 154 mmol/L, Cl- 154 mmol/L)	5
343	Needle Luer Type Disposable	21 G, 0.8 x 38 or 40 mm	0	0	592

344	Needle Luer Type Disposable	19 G, 1.1 x 38 or 40 mm	0	0	458
345	noradrenaline	1mg	10ml	1mg/ml	36
346	Pantoprazole	40mg	40mg	40mg	1
347	Potassium Chloride	7.45-7.50%	//	7.45-7.50%	8
348	Povidon Jod	10%	500ml	//	7
349	Propan-2-ol 447mg/g, Propan-1-ol 19mg/g Benzyl-C12-16-alkyldimethylammonium chlorides 1mg 1L	//	1L	//	7
350	Set steril për Angiografi me përbërje: Angiography folio drape (mbulesë sterile e fushës operatorë) dyshtresore, e ngjeshur që nuk lëshon lëngjet, me dy hapje akses me ngjithës, me dimensione së paku 250x 300cm; Dy mantela steril (L); Shiringë angiografike TH 10-12ml; Three valve manifold; Pjatë për tretje; Gaza 10x10cm (10 copë); Mbulesa për tavolinë pune; Mbulesë transparente për tubin angiografik dhe për Xhamin për mbrojtje nga rrezatimi (transparente).	Set steril për Angiografi me përbërje:	Angiography folio drape (mbulesë sterile e fushës operatorë) dyshtresore, e ngjeshur që nuk lëshon lëngjet, me dy hapje akses me ngjithës, me dimensione së paku 250x 300cm; Dy mantela steril (L); Shiringë angiografike TH 10-12ml; Three valve manifold; Pjatë për tretje; Gaza 10x10cm (10 copë); Mbulesa për tavolinë pune; Mbulesë transparente për tubin angiografik dhe për Xhamin për mbrojtje nga rrezatimi (transparente).	0	930
351	Sheath për Qasje Radiale	1. Sheath për Qasje Radiale Sheath introducer për qasje radiale (radial approach). Madhësia: 5F dhe 6F. Gjatësia: 10 – 25 cm. Të pajisur me mini guidewire kompatibil (0.018” – 0.021” x 45cm) për secilin sheath. Të pajisur me gjilpërë metalike punktuese 20 Gose 21 G.	Materiali i sheath-it dhe komponentët përcjellës duhet të jenë të testuar për biokompatibilitet sipas ISO 10993, të kenë fleksibilitet adekuat dhe rezistencë ndaj kinksimit. Të ofrohet deklarata e përputhshmërisë nga prodhuesi me standardet evropiane dhe certifikatat përkatëse.	0	737

352	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme për forcë, radiopacitet dhe fleksibilitet. Lyerja: Polimerbioresorbues PLGA, me kohë të resorbimit ≤ 3 muaj nga implantimi. Bar i eluar: (Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus), me densitet doze të kontrolluar, për elutim të sinkronizuar. Dizajni i stentit: Dizajn me dy konektorë për segment, për të ruajtur fleksibilitetin dhe mbështetjen longitudinale.	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm – 5.00 mm, në rritje progresive (p.sh., 0.25 mm). Gjatësia e disponueshme: Të paktën 8/9 mm deri 38 mm, me mundësi të zgjatjes dhe mbështetje uniforme. Radiopaciteti: I garantuar me përdorimin e markuesveradiopak në të dy skajet e stentit.	0	1
-----	---	---	---	---	---

353	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme për forcë, radiopacitet dhe fleksibilitet. Lyerja: Polimerbioresorbues PLGA, me kohë të resorbimit ≤ 3 muaj nga implantimi. Bar i eluar: (Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus), me densitet doze të kontrolluar, për elutim të sinkronizuar. Dizajni i stentit: Dizajn me dy konektorë për segment, për të ruajtur fleksibilitetin dhe mbështetjen longitudinale.	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm – 5.00 mm, në rritje progresive (p.sh., 0.25 mm). Gjatësia e disponueshme: Të paktën 8/9 mm deri 38 mm, me mundësi të zgjatjes dhe mbështetje uniforme. Radiopaciteti: I garantuar me përdorimin e markuesveradiopak në të dy skajet e stentit.	0	3
-----	---	---	---	---	---

354	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme për forcë, radiopacitet dhe fleksibilitet. Lyerja: Polimerbioresorbues PLGA, me kohë të resorbimit ≤ 3 muaj nga implantimi. Bar i eluar: (Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus), me densitet doze të kontrolluar, për elutim të sinkronizuar. Dizajni i stentit: Dizajn me dy konektorë për segment, për të ruajtur fleksibilitetin dhe mbështetjen longitudinale.	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm – 5.00 mm, në rritje progresive (p.sh., 0.25 mm). Gjatësia e disponueshme: Të paktën 8/9 mm deri 38 mm, me mundësi të zgjatjes dhe mbështetje uniforme. Radiopaciteti: I garantuar me përdorimin e markuesveradiopak në të dy skajet e stentit.	0	1
-----	---	---	---	---	---

355	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme për forcë, radiopacitet dhe fleksibilitet. Lyerja: Polimerbioresorbues PLGA, me kohë të resorbimit ≤ 3 muaj nga implantimi. Bar i eluar: (Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus), me densitet doze të kontrolluar, për elutim të sinkronizuar. Dizajni i stentit: Dizajn me dy konektorë për segment, për të ruajtur fleksibilitetin dhe mbështetjen longitudinale.	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm – 5.00 mm, në rritje progresive (p.sh., 0.25 mm). Gjatësia e disponueshme: Të paktën 8/9 mm deri 38 mm, me mundësi të zgjatjes dhe mbështetje uniforme. Radiopaciteti: I garantuar me përdorimin e markuesveradiopak në të dy skajet e stentit.	0	10
-----	---	---	---	---	----

356	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme për forcë, radiopacitet dhe fleksibilitet. Lyerja: Polimer bioresorbues PLGA, me kohë të resorbimit ≤ 3 muaj nga implantimi. Bar i eluar: (Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus), me densitet doze të kontrolluar, për elutim të sinkronizuar. Dizajni i stentit: Dizajn me dy konektorë për segment, për të ruajtur fleksibilitetin dhe mbështetjen longitudinale.	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm – 5.00 mm, në rritje progresive (p.sh., 0.25 mm). Gjatësia e disponueshme: Të paktën 8/9 mm deri 38 mm, me mundësi të zgjatjes dhe mbështetje uniforme. Radiopaciteti: I garantuar me përdorimin e markuesveradiopak në të dy skajet e stentit.	0	11
-----	---	--	---	---	----

357	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme për forcë, radiopacitet dhe fleksibilitet. Lyerja: Polimerbioresorbues PLGA, me kohë të resorbimit ≤ 3 muaj nga implantimi. Bar i eluar: (Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus), me densitet doze të kontrolluar, për elutim të sinkronizuar. Dizajni i stentit: Dizajn me dy konektorë për segment, për të ruajtur fleksibilitetin dhe mbështetjen longitudinale.	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm – 5.00 mm, në rritje progresive (p.sh., 0.25 mm). Gjatësia e disponueshme: Të paktën 8/9 mm deri 38 mm, me mundësi të zgjatjes dhe mbështetje uniforme. Radiopaciteti: I garantuar me përdorimin e markuesveradiopak në të dy skajet e stentit.	0	4
-----	---	---	---	---	---

358	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme për forcë, radiopacitet dhe fleksibilitet. Lyerja: Polimerbioresorbues PLGA, me kohë të resorbimit ≤ 3 muaj nga implantimi. Bar i eluar: (Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus), me densitet doze të kontrolluar, për elutim të sinkronizuar. Dizajni i stentit: Dizajn me dy konektorë për segment, për të ruajtur fleksibilitetin dhe mbështetjen longitudinale.	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm – 5.00 mm, në rritje progresive (p.sh., 0.25 mm). Gjatësia e disponueshme: Të paktën 8/9 mm deri 38 mm, me mundësi të zgjatjes dhe mbështetje uniforme. Radiopaciteti: I garantuar me përdorimin e markuesveradiopak në të dy skajet e stentit.	0	1
-----	---	---	---	---	---

359	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme për forcë, radiopacitet dhe fleksibilitet. Lyerja: Polimerbioresorbues PLGA, me kohë të resorbimit ≤ 3 muaj nga implantimi. Bar i eluar: (Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus), me densitet doze të kontrolluar, për elutim të sinkronizuar. Dizajni i stentit: Dizajn me dy konektorë për segment, për të ruajtur fleksibilitetin dhe mbështetjen longitudinale.	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm – 5.00 mm, në rritje progresive (p.sh., 0.25 mm). Gjatësia e disponueshme: Të paktën 8/9 mm deri 38 mm, me mundësi të zgjatjes dhe mbështetje uniforme. Radiopaciteti: I garantuar me përdorimin e markuesveradiopak në të dy skajet e stentit.	0	1
-----	---	---	---	---	---

360	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme për forcë, radiopacitet dhe fleksibilitet. Lyerja: Polimerbioresorbues PLGA, me kohë të resorbimit ≤ 3 muaj nga implantimi. Bar i eluar: (Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus), me densitet doze të kontrolluar, për elutim të sinkronizuar. Dizajni i stentit: Dizajn me dy konektorë për segment, për të ruajtur fleksibilitetin dhe mbështetjen longitudinale.	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm – 5.00 mm, në rritje progresive (p.sh., 0.25 mm). Gjatësia e disponueshme: Të paktën 8/9 mm deri 38 mm, me mundësi të zgjatjes dhe mbështetje uniforme. Radiopaciteti: I garantuar me përdorimin e markuesveradiopak në të dy skajet e stentit.	0	15
-----	---	---	---	---	----

361	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme për forcë, radiopacitet dhe fleksibilitet. Lyerja: Polimerbioresorbues PLGA, me kohë të resorbimit ≤ 3 muaj nga implantimi. Bar i eluar: (Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus), me densitet doze të kontrolluar, për elutim të sinkronizuar. Dizajni i stentit: Dizajn me dy konektorë për segment, për të ruajtur fleksibilitetin dhe mbështetjen longitudinale.	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm – 5.00 mm, në rritje progresive (p.sh., 0.25 mm). Gjatësia e disponueshme: Të paktën 8/9 mm deri 38 mm, me mundësi të zgjatjes dhe mbështetje uniforme. Radiopaciteti: I garantuar me përdorimin e markuesveradiopak në të dy skajet e stentit.	0	5
-----	---	---	---	---	---

362	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme për forcë, radiopacitet dhe fleksibilitet. Lyerja: Polimerbioresorbues PLGA, me kohë të resorbimit ≤ 3 muaj nga implantimi. Bar i eluar: (Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus), me densitet doze të kontrolluar, për elutim të sinkronizuar. Dizajni i stentit: Dizajn me dy konektorë për segment, për të ruajtur fleksibilitetin dhe mbështetjen longitudinale.	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm – 5.00 mm, në rritje progresive (p.sh., 0.25 mm). Gjatësia e disponueshme: Të paktën 8/9 mm deri 38 mm, me mundësi të zgjatjes dhe mbështetje uniforme. Radiopaciteti: I garantuar me përdorimin e markuesveradiopak në të dy skajet e stentit.	0	1
-----	---	---	---	---	---

363	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme për forcë, radiopacitet dhe fleksibilitet. Lyerja: Polimerbioresorbues PLGA, me kohë të resorbimit ≤ 3 muaj nga implantimi. Bar i eluar: (Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus), me densitet doze të kontrolluar, për elutim të sinkronizuar. Dizajni i stentit: Dizajn me dy konektorë për segment, për të ruajtur fleksibilitetin dhe mbështetjen longitudinale.	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm – 5.00 mm, në rritje progresive (p.sh., 0.25 mm). Gjatësia e disponueshme: Të paktën 8/9 mm deri 38 mm, me mundësi të zgjatjes dhe mbështetje uniforme. Radiopaciteti: I garantuar me përdorimin e markuesveradiopak në të dy skajet e stentit.	0	17
-----	---	---	---	---	----

364	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme për forcë, radiopacitet dhe fleksibilitet. Lyerja: Polimerbioresorbues PLGA, me kohë të resorbimit ≤ 3 muaj nga implantimi. Bar i eluar: (Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus), me densitet doze të kontrolluar, për elutim të sinkronizuar. Dizajni i stentit: Dizajn me dy konektorë për segment, për të ruajtur fleksibilitetin dhe mbështetjen longitudinale.	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm – 5.00 mm, në rritje progresive (p.sh., 0.25 mm). Gjatësia e disponueshme: Të paktën 8/9 mm deri 38 mm, me mundësi të zgjatjes dhe mbështetje uniforme. Radiopaciteti: I garantuar me përdorimin e markuesveradiopak në të dy skajet e stentit.	0	4
-----	---	---	---	---	---

365	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme për forcë, radiopacitet dhe fleksibilitet. Lyerja: Polimerbioresorbues PLGA, me kohë të resorbimit ≤ 3 muaj nga implantimi. Bar i eluar: (Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus), me densitet doze të kontrolluar, për elutim të sinkronizuar. Dizajni i stentit: Dizajn me dy konektorë për segment, për të ruajtur fleksibilitetin dhe mbështetjen longitudinale.	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm – 5.00 mm, në rritje progresive (p.sh., 0.25 mm). Gjatësia e disponueshme: Të paktën 8/9 mm deri 38 mm, me mundësi të zgjatjes dhe mbështetje uniforme. Radiopaciteti: I garantuar me përdorimin e markuesveradiopak në të dy skajet e stentit.	0	37
-----	---	---	---	---	----

366	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme për forcë, radiopacitet dhe fleksibilitet. Lyerja: Polimerbioresorbues PLGA, me kohë të resorbimit ≤ 3 muaj nga implantimi. Bar i eluar: (Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus), me densitet doze të kontrolluar, për elutim të sinkronizuar. Dizajni i stentit: Dizajn me dy konektorë për segment, për të ruajtur fleksibilitetin dhe mbështetjen longitudinale.	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm – 5.00 mm, në rritje progresive (p.sh., 0.25 mm). Gjatësia e disponueshme: Të paktën 8/9 mm deri 38 mm, me mundësi të zgjatjes dhe mbështetje uniforme. Radiopaciteti: I garantuar me përdorimin e markuesveradiopak në të dy skajet e stentit.	0	20
-----	---	---	---	---	----

367	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme për forcë, radiopacitet dhe fleksibilitet. Lyerja: Polimerbioresorbues PLGA, me kohë të resorbimit ≤ 3 muaj nga implantimi. Bar i eluar: (Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus), me densitet doze të kontrolluar, për elutim të sinkronizuar. Dizajni i stentit: Dizajn me dy konektorë për segment, për të ruajtur fleksibilitetin dhe mbështetjen longitudinale.	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm – 5.00 mm, në rritje progresive (p.sh., 0.25 mm). Gjatësia e disponueshme: Të paktën 8/9 mm deri 38 mm, me mundësi të zgjatjes dhe mbështetje uniforme. Radiopaciteti: I garantuar me përdorimin e markuesveradiopak në të dy skajet e stentit.	0	5
-----	---	---	---	---	---

368	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme për forcë, radiopacitet dhe fleksibilitet. Lyerja: Polimerbioresorbues PLGA, me kohë të resorbimit ≤ 3 muaj nga implantimi. Bar i eluar: (Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus), me densitet doze të kontrolluar, për elutim të sinkronizuar. Dizajni i stentit: Dizajn me dy konektorë për segment, për të ruajtur fleksibilitetin dhe mbështetjen longitudinale.	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm – 5.00 mm, në rritje progresive (p.sh., 0.25 mm). Gjatësia e disponueshme: Të paktën 8/9 mm deri 38 mm, me mundësi të zgjatjes dhe mbështetje uniforme. Radiopaciteti: I garantuar me përdorimin e markuesveradiopak në të dy skajet e stentit.	0	1
-----	---	---	---	---	---

369	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme për forcë, radiopacitet dhe fleksibilitet. Lyerja: Polimerbioresorbues PLGA, me kohë të resorbimit ≤ 3 muaj nga implantimi. Bar i eluar: (Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus), me densitet doze të kontrolluar, për elutim të sinkronizuar. Dizajni i stentit: Dizajn me dy konektorë për segment, për të ruajtur fleksibilitetin dhe mbështetjen longitudinale.	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm – 5.00 mm, në rritje progresive (p.sh., 0.25 mm). Gjatësia e disponueshme: Të paktën 8/9 mm deri 38 mm, me mundësi të zgjatjes dhe mbështetje uniforme. Radiopaciteti: I garantuar me përdorimin e markuesveradiopak në të dy skajet e stentit.	0	8
-----	---	---	---	---	---

370	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme për forcë, radiopacitet dhe fleksibilitet. Lyerja: Polimerbioresorbues PLGA, me kohë të resorbimit ≤ 3 muaj nga implantimi. Bar i eluar: (Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus), me densitet doze të kontrolluar, për elutim të sinkronizuar. Dizajni i stentit: Dizajn me dy konektorë për segment, për të ruajtur fleksibilitetin dhe mbështetjen longitudinale.	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm – 5.00 mm, në rritje progresive (p.sh., 0.25 mm). Gjatësia e disponueshme: Të paktën 8/9 mm deri 38 mm, me mundësi të zgjatjes dhe mbështetje uniforme. Radiopaciteti: I garantuar me përdorimin e markuesveradiopak në të dy skajet e stentit.	0	5
-----	---	---	---	---	---

371	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme për forcë, radiopacitet dhe fleksibilitet. Lyerja: Polimerbioresorbues PLGA, me kohë të resorbimit ≤ 3 muaj nga implantimi. Bar i eluar: (Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus), me densitet doze të kontrolluar, për elutim të sinkronizuar. Dizajni i stentit: Dizajn me dy konektorë për segment, për të ruajtur fleksibilitetin dhe mbështetjen longitudinale.	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës ≤ 80 µm (nano-strut 70–85 µm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm – 5.00 mm, në rritje progresive (p.sh., 0.25 mm). Gjatësia e disponueshme: Të paktën 8/9 mm deri 38 mm, me mundësi të zgjatjes dhe mbështetje uniforme. Radiopaciteti: I garantuar me përdorimin e markuesveradiopak në të dy skajet e stentit.	0	3
-----	---	---	--	---	---

372	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme për forcë, radiopacitet dhe fleksibilitet. Lyerja: Polimerbioresorbues PLGA, me kohë të resorbimit ≤ 3 muaj nga implantimi. Bar i eluar: (Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus), me densitet doze të kontrolluar, për elutim të sinkronizuar. Dizajni i stentit: Dizajn me dy konektorë për segment, për të ruajtur fleksibilitetin dhe mbështetjen longitudinale.	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm – 5.00 mm, në rritje progresive (p.sh., 0.25 mm). Gjatësia e disponueshme: Të paktën 8/9 mm deri 38 mm, me mundësi të zgjatjes dhe mbështetje uniforme. Radiopaciteti: I garantuar me përdorimin e markuesveradiopak në të dy skajet e stentit.	0	6
-----	---	---	---	---	---

373	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme për forcë, radiopacitet dhe fleksibilitet. Lyerja: Polimerbioresorbues PLGA, me kohë të resorbimit ≤ 3 muaj nga implantimi. Bar i eluar: (Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus), me densitet doze të kontrolluar, për elutim të sinkronizuar. Dizajni i stentit: Dizajn me dy konektorë për segment, për të ruajtur fleksibilitetin dhe mbështetjen longitudinale.	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm – 5.00 mm, në rritje progresive (p.sh., 0.25 mm). Gjatësia e disponueshme: Të paktën 8/9 mm deri 38 mm, me mundësi të zgjatjes dhe mbështetje uniforme. Radiopaciteti: I garantuar me përdorimin e markuesveradiopak në të dy skajet e stentit.	0	2
-----	---	---	---	---	---

374	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme për forcë, radiopacitet dhe fleksibilitet. Lyerja: Polimerbioresorbues PLGA, me kohë të resorbimit ≤ 3 muaj nga implantimi. Bar i eluar: (Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus), me densitet doze të kontrolluar, për elutim të sinkronizuar. Dizajni i stentit: Dizajn me dy konektorë për segment, për të ruajtur fleksibilitetin dhe mbështetjen longitudinale.	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm – 5.00 mm, në rritje progresive (p.sh., 0.25 mm). Gjatësia e disponueshme: Të paktën 8/9 mm deri 38 mm, me mundësi të zgjatjes dhe mbështetje uniforme. Radiopaciteti: I garantuar me përdorimin e markuesveradiopak në të dy skajet e stentit.	0	4
-----	---	---	---	---	---

375	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme për forcë, radiopacitet dhe fleksibilitet. Lyerja: Polimerbioresorbues PLGA, me kohë të resorbimit ≤ 3 muaj nga implantimi. Bar i eluar: (Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus), me densitet doze të kontrolluar, për elutim të sinkronizuar. Dizajni i stentit: Dizajn me dy konektorë për segment, për të ruajtur fleksibilitetin dhe mbështetjen longitudinale.	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm – 5.00 mm, në rritje progresive (p.sh., 0.25 mm). Gjatësia e disponueshme: Të paktën 8/9 mm deri 38 mm, me mundësi të zgjatjes dhe mbështetje uniforme. Radiopaciteti: I garantuar me përdorimin e markuesveradiopak në të dy skajet e stentit.	0	9
-----	---	---	---	---	---

376	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme për forcë, radiopacitet dhe fleksibilitet. Lyerja: Polimerbioresorbues PLGA, me kohë të resorbimit ≤ 3 muaj nga implantimi. Bar i eluar: (Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus), me densitet doze të kontrolluar, për elutim të sinkronizuar. Dizajni i stentit: Dizajn me dy konektorë për segment, për të ruajtur fleksibilitetin dhe mbështetjen longitudinale.	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm – 5.00 mm, në rritje progresive (p.sh., 0.25 mm). Gjatësia e disponueshme: Të paktën 8/9 mm deri 38 mm, me mundësi të zgjatjes dhe mbështetje uniforme. Radiopaciteti: I garantuar me përdorimin e markuesveradiopak në të dy skajet e stentit.	0	48
-----	---	---	---	---	----

377	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme për forcë, radiopacitet dhe fleksibilitet. Lyerja: Polimerbioresorbues PLGA, me kohë të resorbimit ≤ 3 muaj nga implantimi. Bar i eluar: (Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus), me densitet doze të kontrolluar, për elutim të sinkronizuar. Dizajni i stentit: Dizajn me dy konektorë për segment, për të ruajtur fleksibilitetin dhe mbështetjen longitudinale.	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm – 5.00 mm, në rritje progresive (p.sh., 0.25 mm). Gjatësia e disponueshme: Të paktën 8/9 mm deri 38 mm, me mundësi të zgjatjes dhe mbështetje uniforme. Radiopaciteti: I garantuar me përdorimin e markuesveradiopak në të dy skajet e stentit.	0	1
-----	---	---	---	---	---

378	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme për forcë, radiopacitet dhe fleksibilitet. Lyerja: Polimerbioresorbues PLGA, me kohë të resorbimit ≤ 3 muaj nga implantimi. Bar i eluar: (Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus), me densitet doze të kontrolluar, për elutim të sinkronizuar. Dizajni i stentit: Dizajn me dy konektorë për segment, për të ruajtur fleksibilitetin dhe mbështetjen longitudinale.	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm – 5.00 mm, në rritje progresive (p.sh., 0.25 mm). Gjatësia e disponueshme: Të paktën 8/9 mm deri 38 mm, me mundësi të zgjatjes dhe mbështetje uniforme. Radiopaciteti: I garantuar me përdorimin e markuesveradiopak në të dy skajet e stentit.	0	1
-----	---	---	---	---	---

379	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme për forcë, radiopacitet dhe fleksibilitet. Lyerja: Polimerbioresorbues PLGA, me kohë të resorbimit ≤ 3 muaj nga implantimi. Bar i eluar: (Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus), me densitet doze të kontrolluar, për elutim të sinkronizuar. Dizajni i stentit: Dizajn me dy konektorë për segment, për të ruajtur fleksibilitetin dhe mbështetjen longitudinale.	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm – 5.00 mm, në rritje progresive (p.sh., 0.25 mm). Gjatësia e disponueshme: Të paktën 8/9 mm deri 38 mm, me mundësi të zgjatjes dhe mbështetje uniforme. Radiopaciteti: I garantuar me përdorimin e markuesveradiopak në të dy skajet e stentit.	0	5
-----	---	---	---	---	---

380	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme për forcë, radiopacitet dhe fleksibilitet. Lyerja: Polimerbioresorbues PLGA, me kohë të resorbimit ≤ 3 muaj nga implantimi. Bar i eluar: (Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus), me densitet doze të kontrolluar, për elutim të sinkronizuar. Dizajni i stentit: Dizajn me dy konektorë për segment, për të ruajtur fleksibilitetin dhe mbështetjen longitudinale.	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm – 5.00 mm, në rritje progresive (p.sh., 0.25 mm). Gjatësia e disponueshme: Të paktën 8/9 mm deri 38 mm, me mundësi të zgjatjes dhe mbështetje uniforme. Radiopaciteti: I garantuar me përdorimin e markuesveradiopak në të dy skajet e stentit.	0	1
-----	---	---	---	---	---

381	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme për forcë, radiopacitet dhe fleksibilitet. Lyerja: Polimerbioresorbues PLGA, me kohë të resorbimit ≤ 3 muaj nga implantimi. Bar i eluar: (Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus), me densitet doze të kontrolluar, për elutim të sinkronizuar. Dizajni i stentit: Dizajn me dy konektorë për segment, për të ruajtur fleksibilitetin dhe mbështetjen longitudinale.	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm – 5.00 mm, në rritje progresive (p.sh., 0.25 mm). Gjatësia e disponueshme: Të paktën 8/9 mm deri 38 mm, me mundësi të zgjatjes dhe mbështetje uniforme. Radiopaciteti: I garantuar me përdorimin e markuesveradiopak në të dy skajet e stentit.	0	7
-----	---	---	---	---	---

382	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme për forcë, radiopacitet dhe fleksibilitet. Lyerja: Polimerbioresorbues PLGA, me kohë të resorbimit ≤ 3 muaj nga implantimi. Bar i eluar: (Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus), me densitet doze të kontrolluar, për elutim të sinkronizuar. Dizajni i stentit: Dizajn me dy konektorë për segment, për të ruajtur fleksibilitetin dhe mbështetjen longitudinale.	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm – 5.00 mm, në rritje progresive (p.sh., 0.25 mm). Gjatësia e disponueshme: Të paktën 8/9 mm deri 38 mm, me mundësi të zgjatjes dhe mbështetje uniforme. Radiopaciteti: I garantuar me përdorimin e markuesveradiopak në të dy skajet e stentit.	0	2
-----	---	---	---	---	---

383	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme për forcë, radiopacitet dhe fleksibilitet. Lyerja: Polimerbioresorbues PLGA, me kohë të resorbimit ≤ 3 muaj nga implantimi. Bar i eluar: (Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus), me densitet doze të kontrolluar, për elutim të sinkronizuar. Dizajni i stentit: Dizajn me dy konektorë për segment, për të ruajtur fleksibilitetin dhe mbështetjen longitudinale.	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm – 5.00 mm, në rritje progresive (p.sh., 0.25 mm). Gjatësia e disponueshme: Të paktën 8/9 mm deri 38 mm, me mundësi të zgjatjes dhe mbështetje uniforme. Radiopaciteti: I garantuar me përdorimin e markuesveradiopak në të dy skajet e stentit.	0	3
-----	---	---	---	---	---

384	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme për forcë, radiopacitet dhe fleksibilitet. Lyerja: Polimerbioresorbues PLGA, me kohë të resorbimit ≤ 3 muaj nga implantimi. Bar i eluar: (Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus), me densitet doze të kontrolluar, për elutim të sinkronizuar. Dizajni i stentit: Dizajn me dy konektorë për segment, për të ruajtur fleksibilitetin dhe mbështetjen longitudinale.	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm – 5.00 mm, në rritje progresive (p.sh., 0.25 mm). Gjatësia e disponueshme: Të paktën 8/9 mm deri 38 mm, me mundësi të zgjatjes dhe mbështetje uniforme. Radiopaciteti: I garantuar me përdorimin e markuesveradiopak në të dy skajet e stentit.	0	4
-----	---	---	---	---	---

385	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme për forcë, radiopacitet dhe fleksibilitet. Lyerja: Polimerbioresorbues PLGA, me kohë të resorbimit ≤ 3 muaj nga implantimi. Bar i eluar: (Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus), me densitet doze të kontrolluar, për elutim të sinkronizuar. Dizajni i stentit: Dizajn me dy konektorë për segment, për të ruajtur fleksibilitetin dhe mbështetjen longitudinale.	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm – 5.00 mm, në rritje progresive (p.sh., 0.25 mm). Gjatësia e disponueshme: Të paktën 8/9 mm deri 38 mm, me mundësi të zgjatjes dhe mbështetje uniforme. Radiopaciteti: I garantuar me përdorimin e markuesveradiopak në të dy skajet e stentit.	0	5
-----	---	---	---	---	---

386	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme për forcë, radiopacitet dhe fleksibilitet. Lyerja: Polimerbioresorbues PLGA, me kohë të resorbimit ≤ 3 muaj nga implantimi. Bar i eluar: (Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus), me densitet doze të kontrolluar, për elutim të sinkronizuar. Dizajni i stentit: Dizajn me dy konektorë për segment, për të ruajtur fleksibilitetin dhe mbështetjen longitudinale.	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm – 5.00 mm, në rritje progresive (p.sh., 0.25 mm). Gjatësia e disponueshme: Të paktën 8/9 mm deri 38 mm, me mundësi të zgjatjes dhe mbështetje uniforme. Radiopaciteti: I garantuar me përdorimin e markuesveradiopak në të dy skajet e stentit.	0	4
-----	---	---	---	---	---

387	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme për forcë, radiopacitet dhe fleksibilitet. Lyerja: Polimerbioresorbues PLGA, me kohë të resorbimit ≤ 3 muaj nga implantimi. Bar i eluar: (Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus), me densitet doze të kontrolluar, për elutim të sinkronizuar. Dizajni i stentit: Dizajn me dy konektorë për segment, për të ruajtur fleksibilitetin dhe mbështetjen longitudinale.	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm – 5.00 mm, në rritje progresive (p.sh., 0.25 mm). Gjatësia e disponueshme: Të paktën 8/9 mm deri 38 mm, me mundësi të zgjatjes dhe mbështetje uniforme. Radiopaciteti: I garantuar me përdorimin e markuesveradiopak në të dy skajet e stentit.	0	5
-----	---	---	---	---	---

388	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme për forcë, radiopacitet dhe fleksibilitet. Lyerja: Polimerbioresorbues PLGA, me kohë të resorbimit ≤ 3 muaj nga implantimi. Bar i eluar: (Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus), me densitet doze të kontrolluar, për elutim të sinkronizuar. Dizajni i stentit: Dizajn me dy konektorë për segment, për të ruajtur fleksibilitetin dhe mbështetjen longitudinale.	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm – 5.00 mm, në rritje progresive (p.sh., 0.25 mm). Gjatësia e disponueshme: Të paktën 8/9 mm deri 38 mm, me mundësi të zgjatjes dhe mbështetje uniforme. Radiopaciteti: I garantuar me përdorimin e markuesveradiopak në të dy skajet e stentit.	0	2
-----	---	---	---	---	---

389	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme për forcë, radiopacitet dhe fleksibilitet. Lyerja: Polimerbioresorbues PLGA, me kohë të resorbimit ≤ 3 muaj nga implantimi. Bar i eluar: (Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus), me densitet doze të kontrolluar, për elutim të sinkronizuar. Dizajni i stentit: Dizajn me dy konektorë për segment, për të ruajtur fleksibilitetin dhe mbështetjen longitudinale.	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm – 5.00 mm, në rritje progresive (p.sh., 0.25 mm). Gjatësia e disponueshme: Të paktën 8/9 mm deri 38 mm, me mundësi të zgjatjes dhe mbështetje uniforme. Radiopaciteti: I garantuar me përdorimin e markuesveradiopak në të dy skajet e stentit.	0	4
-----	---	---	---	---	---

390	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme për forcë, radiopacitet dhe fleksibilitet. Lyerja: Polimerbioresorbues PLGA, me kohë të resorbimit ≤ 3 muaj nga implantimi. Bar i eluar: (Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus), me densitet doze të kontrolluar, për elutim të sinkronizuar. Dizajni i stentit: Dizajn me dy konektorë për segment, për të ruajtur fleksibilitetin dhe mbështetjen longitudinale.	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës ≤ 80 µm (nano-strut 70–85 µm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm – 5.00 mm, në rritje progresive (p.sh., 0.25 mm). Gjatësia e disponueshme: Të paktën 8/9 mm deri 38 mm, me mundësi të zgjatjes dhe mbështetje uniforme. Radiopaciteti: I garantuar me përdorimin e markuesveradiopak në të dy skajet e stentit.	0	5
-----	---	---	--	---	---

391	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme për forcë, radiopacitet dhe fleksibilitet. Lyerja: Polimerbioresorbues PLGA, me kohë të resorbimit ≤ 3 muaj nga implantimi. Bar i eluar: (Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus), me densitet doze të kontrolluar, për elutim të sinkronizuar. Dizajni i stentit: Dizajn me dy konektorë për segment, për të ruajtur fleksibilitetin dhe mbështetjen longitudinale.	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës ≤ 80 µm (nano-strut 70–85 µm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm – 5.00 mm, në rritje progresive (p.sh., 0.25 mm). Gjatësia e disponueshme: Të paktën 8/9 mm deri 38 mm, me mundësi të zgjatjes dhe mbështetje uniforme. Radiopaciteti: I garantuar me përdorimin e markuesveradiopak në të dy skajet e stentit.	0	5
-----	---	---	--	---	---

392	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme për forcë, radiopacitet dhe fleksibilitet. Lyerja: Polimerbioresorbues PLGA, me kohë të resorbimit ≤ 3 muaj nga implantimi. Bar i eluar: (Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus), me densitet doze të kontrolluar, për elutim të sinkronizuar. Dizajni i stentit: Dizajn me dy konektorë për segment, për të ruajtur fleksibilitetin dhe mbështetjen longitudinale.	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës ≤ 80 µm (nano-strut 70–85 µm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm – 5.00 mm, në rritje progresive (p.sh., 0.25 mm). Gjatësia e disponueshme: Të paktën 8/9 mm deri 38 mm, me mundësi të zgjatjes dhe mbështetje uniforme. Radiopaciteti: I garantuar me përdorimin e markuesveradiopak në të dy skajet e stentit.	0	1
-----	---	---	--	---	---

393	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme për forcë, radiopacitet dhe fleksibilitet. Lyerja: Polimerbioresorbues PLGA, me kohë të resorbimit ≤ 3 muaj nga implantimi. Bar i eluar: (Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus), me densitet doze të kontrolluar, për elutim të sinkronizuar. Dizajni i stentit: Dizajn me dy konektorë për segment, për të ruajtur fleksibilitetin dhe mbështetjen longitudinale.	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm – 5.00 mm, në rritje progresive (p.sh., 0.25 mm). Gjatësia e disponueshme: Të paktën 8/9 mm deri 38 mm, me mundësi të zgjatjes dhe mbështetje uniforme. Radiopaciteti: I garantuar me përdorimin e markuesveradiopak në të dy skajet e stentit.	0	1
-----	---	---	---	---	---

394	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme për forcë, radiopacitet dhe fleksibilitet. Lyerja: Polimerbioresorbues PLGA, me kohë të resorbimit ≤ 3 muaj nga implantimi. Bar i eluar: (Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus), me densitet doze të kontrolluar, për elutim të sinkronizuar. Dizajni i stentit: Dizajn me dy konektorë për segment, për të ruajtur fleksibilitetin dhe mbështetjen longitudinale.	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm – 5.00 mm, në rritje progresive (p.sh., 0.25 mm). Gjatësia e disponueshme: Të paktën 8/9 mm deri 38 mm, me mundësi të zgjatjes dhe mbështetje uniforme. Radiopaciteti: I garantuar me përdorimin e markuesveradiopak në të dy skajet e stentit.	0	1
-----	---	---	---	---	---

395	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme për forcë, radiopacitet dhe fleksibilitet. Lyerja: Polimerbioresorbues PLGA, me kohë të resorbimit ≤ 3 muaj nga implantimi. Bar i eluar: (Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus), me densitet doze të kontrolluar, për elutim të sinkronizuar. Dizajni i stentit: Dizajn me dy konektorë për segment, për të ruajtur fleksibilitetin dhe mbështetjen longitudinale.	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm – 5.00 mm, në rritje progresive (p.sh., 0.25 mm). Gjatësia e disponueshme: Të paktën 8/9 mm deri 38 mm, me mundësi të zgjatjes dhe mbështetje uniforme. Radiopaciteti: I garantuar me përdorimin e markuesveradiopak në të dy skajet e stentit.	0	5
-----	---	---	---	---	---

396	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme për forcë, radiopacitet dhe fleksibilitet. Lyerja: Polimerbioresorbues PLGA, me kohë të resorbimit ≤ 3 muaj nga implantimi. Bar i eluar: (Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus), me densitet doze të kontrolluar, për elutim të sinkronizuar. Dizajni i stentit: Dizajn me dy konektorë për segment, për të ruajtur fleksibilitetin dhe mbështetjen longitudinale.	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm – 5.00 mm, në rritje progresive (p.sh., 0.25 mm). Gjatësia e disponueshme: Të paktën 8/9 mm deri 38 mm, me mundësi të zgjatjes dhe mbështetje uniforme. Radiopaciteti: I garantuar me përdorimin e markuesveradiopak në të dy skajet e stentit.	0	28
-----	---	---	---	---	----

397	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme për forcë, radiopacitet dhe fleksibilitet. Lyerja: Polimerbioresorbues PLGA, me kohë të resorbimit ≤ 3 muaj nga implantimi. Bar i eluar: (Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus), me densitet doze të kontrolluar, për elutim të sinkronizuar. Dizajni i stentit: Dizajn me dy konektorë për segment, për të ruajtur fleksibilitetin dhe mbështetjen longitudinale.	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm – 5.00 mm, në rritje progresive (p.sh., 0.25 mm). Gjatësia e disponueshme: Të paktën 8/9 mm deri 38 mm, me mundësi të zgjatjes dhe mbështetje uniforme. Radiopaciteti: I garantuar me përdorimin e markuesveradiopak në të dy skajet e stentit.	0	10
-----	---	---	---	---	----

398	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme për forcë, radiopacitet dhe fleksibilitet. Lyerja: Polimerbioresorbues PLGA, me kohë të resorbimit ≤ 3 muaj nga implantimi. Bar i eluar: (Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus), me densitet doze të kontrolluar, për elutim të sinkronizuar. Dizajni i stentit: Dizajn me dy konektorë për segment, për të ruajtur fleksibilitetin dhe mbështetjen longitudinale.	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm – 5.00 mm, në rritje progresive (p.sh., 0.25 mm). Gjatësia e disponueshme: Të paktën 8/9 mm deri 38 mm, me mundësi të zgjatjes dhe mbështetje uniforme. Radiopaciteti: I garantuar me përdorimin e markuesveradiopak në të dy skajet e stentit.	0	2
-----	---	---	---	---	---

399	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme për forcë, radiopacitet dhe fleksibilitet. Lyerja: Polimer bioresorbues PLGA, me kohë të resorbimit ≤ 3 muaj nga implantimi. Bar i eluar: (Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus), me densitet doze të kontrolluar, për elutim të sinkronizuar. Dizajni i stentit: Dizajn me dy konektorë për segment, për të ruajtur fleksibilitetin dhe mbështetjen longitudinale.	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm – 5.00 mm, në rritje progresive (p.sh., 0.25 mm). Gjatësia e disponueshme: Të paktën 8/9 mm deri 38 mm, me mundësi të zgjatjes dhe mbështetje uniforme. Radiopaciteti: I garantuar me përdorimin e markuesveradiopak në të dy skajet e stentit.	0	14
-----	---	--	---	---	----

400	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme për forcë, radiopacitet dhe fleksibilitet. Lyerja: Polimerbioresorbues PLGA, me kohë të resorbimit ≤ 3 muaj nga implantimi. Bar i eluar: (Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus), me densitet doze të kontrolluar, për elutim të sinkronizuar. Dizajni i stentit: Dizajn me dy konektorë për segment, për të ruajtur fleksibilitetin dhe mbështetjen longitudinale.	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm – 5.00 mm, në rritje progresive (p.sh., 0.25 mm). Gjatësia e disponueshme: Të paktën 8/9 mm deri 38 mm, me mundësi të zgjatjes dhe mbështetje uniforme. Radiopaciteti: I garantuar me përdorimin e markuesveradiopak në të dy skajet e stentit.	0	50
-----	---	---	---	---	----

401	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme për forcë, radiopacitet dhe fleksibilitet. Lyerja: Polimerbioresorbues PLGA, me kohë të resorbimit ≤ 3 muaj nga implantimi. Bar i eluar: (Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus), me densitet doze të kontrolluar, për elutim të sinkronizuar. Dizajni i stentit: Dizajn me dy konektorë për segment, për të ruajtur fleksibilitetin dhe mbështetjen longitudinale.	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm – 5.00 mm, në rritje progresive (p.sh., 0.25 mm). Gjatësia e disponueshme: Të paktën 8/9 mm deri 38 mm, me mundësi të zgjatjes dhe mbështetje uniforme. Radiopaciteti: I garantuar me përdorimin e markuesveradiopak në të dy skajet e stentit.	0	4
-----	---	---	---	---	---

402	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme për forcë, radiopacitet dhe fleksibilitet. Lyerja: Polimerbioresorbues PLGA, me kohë të resorbimit ≤ 3 muaj nga implantimi. Bar i eluar: (Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus), me densitet doze të kontrolluar, për elutim të sinkronizuar. Dizajni i stentit: Dizajn me dy konektorë për segment, për të ruajtur fleksibilitetin dhe mbështetjen longitudinale.	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm – 5.00 mm, në rritje progresive (p.sh., 0.25 mm). Gjatësia e disponueshme: Të paktën 8/9 mm deri 38 mm, me mundësi të zgjatjes dhe mbështetje uniforme. Radiopaciteti: I garantuar me përdorimin e markuesveradiopak në të dy skajet e stentit.	0	2
-----	---	---	---	---	---

403	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme për forcë, radiopacitet dhe fleksibilitet. Lyerja: Polimerbioresorbues PLGA, me kohë të resorbimit ≤ 3 muaj nga implantimi. Bar i eluar: (Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus), me densitet doze të kontrolluar, për elutim të sinkronizuar. Dizajni i stentit: Dizajn me dy konektorë për segment, për të ruajtur fleksibilitetin dhe mbështetjen longitudinale.	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm – 5.00 mm, në rritje progresive (p.sh., 0.25 mm). Gjatësia e disponueshme: Të paktën 8/9 mm deri 38 mm, me mundësi të zgjatjes dhe mbështetje uniforme. Radiopaciteti: I garantuar me përdorimin e markuesveradiopak në të dy skajet e stentit.	0	8
-----	---	---	---	---	---

404	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme për forcë, radiopacitet dhe fleksibilitet. Lyerja: Polimerbioresorbues PLGA, me kohë të resorbimit ≤ 3 muaj nga implantimi. Bar i eluar: (Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus), me densitet doze të kontrolluar, për elutim të sinkronizuar. Dizajni i stentit: Dizajn me dy konektorë për segment, për të ruajtur fleksibilitetin dhe mbështetjen longitudinale.	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm – 5.00 mm, në rritje progresive (p.sh., 0.25 mm). Gjatësia e disponueshme: Të paktën 8/9 mm deri 38 mm, me mundësi të zgjatjes dhe mbështetje uniforme. Radiopaciteti: I garantuar me përdorimin e markuesveradiopak në të dy skajet e stentit.	0	14
-----	---	---	---	---	----

405	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme për forcë, radiopacitet dhe fleksibilitet. Lyerja: Polimerbioresorbues PLGA, me kohë të resorbimit ≤ 3 muaj nga implantimi. Bar i eluar: (Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus), me densitet doze të kontrolluar, për elutim të sinkronizuar. Dizajni i stentit: Dizajn me dy konektorë për segment, për të ruajtur fleksibilitetin dhe mbështetjen longitudinale.	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm – 5.00 mm, në rritje progresive (p.sh., 0.25 mm). Gjatësia e disponueshme: Të paktën 8/9 mm deri 38 mm, me mundësi të zgjatjes dhe mbështetje uniforme. Radiopaciteti: I garantuar me përdorimin e markuesveradiopak në të dy skajet e stentit.	0	40
-----	---	---	---	---	----

406	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme për forcë, radiopacitet dhe fleksibilitet. Lyerja: Polimerbioresorbues PLGA, me kohë të resorbimit ≤ 3 muaj nga implantimi. Bar i eluar: (Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus), me densitet doze të kontrolluar, për elutim të sinkronizuar. Dizajni i stentit: Dizajn me dy konektorë për segment, për të ruajtur fleksibilitetin dhe mbështetjen longitudinale.	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm – 5.00 mm, në rritje progresive (p.sh., 0.25 mm). Gjatësia e disponueshme: Të paktën 8/9 mm deri 38 mm, me mundësi të zgjatjes dhe mbështetje uniforme. Radiopaciteti: I garantuar me përdorimin e markuesveradiopak në të dy skajet e stentit.	0	2
-----	---	---	---	---	---

407	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme për forcë, radiopacitet dhe fleksibilitet. Lyerja: Polimerbioresorbues PLGA, me kohë të resorbimit ≤ 3 muaj nga implantimi. Bar i eluar: (Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus), me densitet doze të kontrolluar, për elutim të sinkronizuar. Dizajni i stentit: Dizajn me dy konektorë për segment, për të ruajtur fleksibilitetin dhe mbështetjen longitudinale.	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm – 5.00 mm, në rritje progresive (p.sh., 0.25 mm). Gjatësia e disponueshme: Të paktën 8/9 mm deri 38 mm, me mundësi të zgjatjes dhe mbështetje uniforme. Radiopaciteti: I garantuar me përdorimin e markuesveradiopak në të dy skajet e stentit.	0	1
-----	---	---	---	---	---

408	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme për forcë, radiopacitet dhe fleksibilitet. Lyerja: Polimerbioresorbues PLGA, me kohë të resorbimit ≤ 3 muaj nga implantimi. Bar i eluar: (Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus), me densitet doze të kontrolluar, për elutim të sinkronizuar. Dizajni i stentit: Dizajn me dy konektorë për segment, për të ruajtur fleksibilitetin dhe mbështetjen longitudinale.	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm – 5.00 mm, në rritje progresive (p.sh., 0.25 mm). Gjatësia e disponueshme: Të paktën 8/9 mm deri 38 mm, me mundësi të zgjatjes dhe mbështetje uniforme. Radiopaciteti: I garantuar me përdorimin e markuesveradiopak në të dy skajet e stentit.	0	3
-----	---	---	---	---	---

409	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme për forcë, radiopacitet dhe fleksibilitet. Lyerja: Polimerbioresorbues PLGA, me kohë të resorbimit ≤ 3 muaj nga implantimi. Bar i eluar: (Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus), me densitet doze të kontrolluar, për elutim të sinkronizuar. Dizajni i stentit: Dizajn me dy konektorë për segment, për të ruajtur fleksibilitetin dhe mbështetjen longitudinale.	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm – 5.00 mm, në rritje progresive (p.sh., 0.25 mm). Gjatësia e disponueshme: Të paktën 8/9 mm deri 38 mm, me mundësi të zgjatjes dhe mbështetje uniforme. Radiopaciteti: I garantuar me përdorimin e markuesveradiopak në të dy skajet e stentit.	0	3
-----	---	---	---	---	---

410	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme për forcë, radiopacitet dhe fleksibilitet. Lyerja: Polimerbioresorbues PLGA, me kohë të resorbimit ≤ 3 muaj nga implantimi. Bar i eluar: (Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus), me densitet doze të kontrolluar, për elutim të sinkronizuar. Dizajni i stentit: Dizajn me dy konektorë për segment, për të ruajtur fleksibilitetin dhe mbështetjen longitudinale.	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm – 5.00 mm, në rritje progresive (p.sh., 0.25 mm). Gjatësia e disponueshme: Të paktën 8/9 mm deri 38 mm, me mundësi të zgjatjes dhe mbështetje uniforme. Radiopaciteti: I garantuar me përdorimin e markuesveradiopak në të dy skajet e stentit.	0	1
-----	---	---	---	---	---

411	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme për forcë, radiopacitet dhe fleksibilitet. Lyerja: Polimerbioresorbues PLGA, me kohë të resorbimit ≤ 3 muaj nga implantimi. Bar i eluar: (Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus), me densitet doze të kontrolluar, për elutim të sinkronizuar. Dizajni i stentit: Dizajn me dy konektorë për segment, për të ruajtur fleksibilitetin dhe mbështetjen longitudinale.	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm – 5.00 mm, në rritje progresive (p.sh., 0.25 mm). Gjatësia e disponueshme: Të paktën 8/9 mm deri 38 mm, me mundësi të zgjatjes dhe mbështetje uniforme. Radiopaciteti: I garantuar me përdorimin e markuesveradiopak në të dy skajet e stentit.	0	14
-----	---	---	---	---	----

412	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme për forcë, radiopacitet dhe fleksibilitet. Lyerja: Polimerbioresorbues PLGA, me kohë të resorbimit ≤ 3 muaj nga implantimi. Bar i eluar: (Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus), me densitet doze të kontrolluar, për elutim të sinkronizuar. Dizajni i stentit: Dizajn me dy konektorë për segment, për të ruajtur fleksibilitetin dhe mbështetjen longitudinale.	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm – 5.00 mm, në rritje progresive (p.sh., 0.25 mm). Gjatësia e disponueshme: Të paktën 8/9 mm deri 38 mm, me mundësi të zgjatjes dhe mbështetje uniforme. Radiopaciteti: I garantuar me përdorimin e markuesveradiopak në të dy skajet e stentit.	0	1
-----	---	---	---	---	---

413	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme për forcë, radiopacitet dhe fleksibilitet. Lyerja: Polimerbioresorbues PLGA, me kohë të resorbimit ≤ 3 muaj nga implantimi. Bar i eluar: (Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus), me densitet doze të kontrolluar, për elutim të sinkronizuar. Dizajni i stentit: Dizajn me dy konektorë për segment, për të ruajtur fleksibilitetin dhe mbështetjen longitudinale.	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm – 5.00 mm, në rritje progresive (p.sh., 0.25 mm). Gjatësia e disponueshme: Të paktën 8/9 mm deri 38 mm, me mundësi të zgjatjes dhe mbështetje uniforme. Radiopaciteti: I garantuar me përdorimin e markuesveradiopak në të dy skajet e stentit.	0	15
-----	---	---	---	---	----

414	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme për forcë, radiopacitet dhe fleksibilitet. Lyerja: Polimerbioresorbues PLGA, me kohë të resorbimit ≤ 3 muaj nga implantimi. Bar i eluar: (Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus), me densitet doze të kontrolluar, për elutim të sinkronizuar. Dizajni i stentit: Dizajn me dy konektorë për segment, për të ruajtur fleksibilitetin dhe mbështetjen longitudinale.	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm – 5.00 mm, në rritje progresive (p.sh., 0.25 mm). Gjatësia e disponueshme: Të paktën 8/9 mm deri 38 mm, me mundësi të zgjatjes dhe mbështetje uniforme. Radiopaciteti: I garantuar me përdorimin e markuesveradiopak në të dy skajet e stentit.	0	5
-----	---	---	---	---	---

415	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme për forcë, radiopacitet dhe fleksibilitet. Lyerja: Polimerbioresorbues PLGA, me kohë të resorbimit ≤ 3 muaj nga implantimi. Bar i eluar: (Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus), me densitet doze të kontrolluar, për elutim të sinkronizuar. Dizajni i stentit: Dizajn me dy konektorë për segment, për të ruajtur fleksibilitetin dhe mbështetjen longitudinale.	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm – 5.00 mm, në rritje progresive (p.sh., 0.25 mm). Gjatësia e disponueshme: Të paktën 8/9 mm deri 38 mm, me mundësi të zgjatjes dhe mbështetje uniforme. Radiopaciteti: I garantuar me përdorimin e markuesveradiopak në të dy skajet e stentit.	0	12
-----	---	---	---	---	----

416	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme për forcë, radiopacitet dhe fleksibilitet. Lyerja: Polimerbioresorbues PLGA, me kohë të resorbimit ≤ 3 muaj nga implantimi. Bar i eluar: (Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus), me densitet doze të kontrolluar, për elutim të sinkronizuar. Dizajni i stentit: Dizajn me dy konektorë për segment, për të ruajtur fleksibilitetin dhe mbështetjen longitudinale.	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm – 5.00 mm, në rritje progresive (p.sh., 0.25 mm). Gjatësia e disponueshme: Të paktën 8/9 mm deri 38 mm, me mundësi të zgjatjes dhe mbështetje uniforme. Radiopaciteti: I garantuar me përdorimin e markuesveradiopak në të dy skajet e stentit.	0	1
-----	---	---	---	---	---

417	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme për forcë, radiopacitet dhe fleksibilitet. Lyerja: Polimer bioresorbues PLGA, me kohë të resorbimit ≤ 3 muaj nga implantimi. Bar i eluar: (Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus), me densitet doze të kontrolluar, për elutim të sinkronizuar. Dizajni i stentit: Dizajn me dy konektorë për segment, për të ruajtur fleksibilitetin dhe mbështetjen longitudinale.	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm – 5.00 mm, në rritje progresive (p.sh., 0.25 mm). Gjatësia e disponueshme: Të paktën 8/9 mm deri 38 mm, me mundësi të zgjatjes dhe mbështetje uniforme. Radiopaciteti: I garantuar me përdorimin e markuesveradiopak në të dy skajet e stentit.	0	5
-----	---	--	---	---	---

418	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme për forcë, radiopacitet dhe fleksibilitet. Lyerja: Polimerbioresorbues PLGA, me kohë të resorbimit ≤ 3 muaj nga implantimi. Bar i eluar: (Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus), me densitet doze të kontrolluar, për elutim të sinkronizuar. Dizajni i stentit: Dizajn me dy konektorë për segment, për të ruajtur fleksibilitetin dhe mbështetjen longitudinale.	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm – 5.00 mm, në rritje progresive (p.sh., 0.25 mm). Gjatësia e disponueshme: Të paktën 8/9 mm deri 38 mm, me mundësi të zgjatjes dhe mbështetje uniforme. Radiopaciteti: I garantuar me përdorimin e markuesveradiopak në të dy skajet e stentit.	0	15
-----	---	---	---	---	----

419	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme për forcë, radiopacitet dhe fleksibilitet. Lyerja: Polimerbioresorbues PLGA, me kohë të resorbimit ≤ 3 muaj nga implantimi. Bar i eluar: (Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus), me densitet doze të kontrolluar, për elutim të sinkronizuar. Dizajni i stentit: Dizajn me dy konektorë për segment, për të ruajtur fleksibilitetin dhe mbështetjen longitudinale.	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm – 5.00 mm, në rritje progresive (p.sh., 0.25 mm). Gjatësia e disponueshme: Të paktën 8/9 mm deri 38 mm, me mundësi të zgjatjes dhe mbështetje uniforme. Radiopaciteti: I garantuar me përdorimin e markuesveradiopak në të dy skajet e stentit.	0	15
-----	---	---	---	---	----

420	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme për forcë, radiopacitet dhe fleksibilitet. Lyerja: Polimer bioresorbues PLGA, me kohë të resorbimit ≤ 3 muaj nga implantimi. Bar i eluar: (Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus), me densitet doze të kontrolluar, për elutim të sinkronizuar. Dizajni i stentit: Dizajn me dy konektorë për segment, për të ruajtur fleksibilitetin dhe mbështetjen longitudinale.	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm – 5.00 mm, në rritje progresive (p.sh., 0.25 mm). Gjatësia e disponueshme: Të paktën 8/9 mm deri 38 mm, me mundësi të zgjatjes dhe mbështetje uniforme. Radiopaciteti: I garantuar me përdorimin e markuesveradiopak në të dy skajet e stentit.	0	5
-----	---	--	---	---	---

421	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme për forcë, radiopacitet dhe fleksibilitet. Lyerja: Polimerbioresorbues PLGA, me kohë të resorbimit ≤ 3 muaj nga implantimi. Bar i eluar: (Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus), me densitet doze të kontrolluar, për elutim të sinkronizuar. Dizajni i stentit: Dizajn me dy konektorë për segment, për të ruajtur fleksibilitetin dhe mbështetjen longitudinale.	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm – 5.00 mm, në rritje progresive (p.sh., 0.25 mm). Gjatësia e disponueshme: Të paktën 8/9 mm deri 38 mm, me mundësi të zgjatjes dhe mbështetje uniforme. Radiopaciteti: I garantuar me përdorimin e markuesveradiopak në të dy skajet e stentit.	0	2
-----	---	---	---	---	---

422	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme për forcë, radiopacitet dhe fleksibilitet. Lyerja: Polimerbioresorbues PLGA, me kohë të resorbimit ≤ 3 muaj nga implantimi. Bar i eluar: (Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus), me densitet doze të kontrolluar, për elutim të sinkronizuar. Dizajni i stentit: Dizajn me dy konektorë për segment, për të ruajtur fleksibilitetin dhe mbështetjen longitudinale.	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm – 5.00 mm, në rritje progresive (p.sh., 0.25 mm). Gjatësia e disponueshme: Të paktën 8/9 mm deri 38 mm, me mundësi të zgjatjes dhe mbështetje uniforme. Radiopaciteti: I garantuar me përdorimin e markuesveradiopak në të dy skajet e stentit.	0	10
-----	---	---	---	---	----

423	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme për forcë, radiopacitet dhe fleksibilitet. Lyerja: Polimerbioresorbues PLGA, me kohë të resorbimit ≤ 3 muaj nga implantimi. Bar i eluar: (Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus), me densitet doze të kontrolluar, për elutim të sinkronizuar. Dizajni i stentit: Dizajn me dy konektorë për segment, për të ruajtur fleksibilitetin dhe mbështetjen longitudinale.	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm – 5.00 mm, në rritje progresive (p.sh., 0.25 mm). Gjatësia e disponueshme: Të paktën 8/9 mm deri 38 mm, me mundësi të zgjatjes dhe mbështetje uniforme. Radiopaciteti: I garantuar me përdorimin e markuesveradiopak në të dy skajet e stentit.	0	5
-----	---	---	---	---	---

424	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme për forcë, radiopacitet dhe fleksibilitet. Lyerja: Polimerbioresorbues PLGA, me kohë të resorbimit ≤ 3 muaj nga implantimi. Bar i eluar: (Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus), me densitet doze të kontrolluar, për elutim të sinkronizuar. Dizajni i stentit: Dizajn me dy konektorë për segment, për të ruajtur fleksibilitetin dhe mbështetjen longitudinale.	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm – 5.00 mm, në rritje progresive (p.sh., 0.25 mm). Gjatësia e disponueshme: Të paktën 8/9 mm deri 38 mm, me mundësi të zgjatjes dhe mbështetje uniforme. Radiopaciteti: I garantuar me përdorimin e markuesveradiopak në të dy skajet e stentit.	0	1
-----	---	---	---	---	---

425	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme për forcë, radiopacitet dhe fleksibilitet. Lyerja: Polimerbioresorbues PLGA, me kohë të resorbimit ≤ 3 muaj nga implantimi. Bar i eluar: (Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus), me densitet doze të kontrolluar, për elutim të sinkronizuar. Dizajni i stentit: Dizajn me dy konektorë për segment, për të ruajtur fleksibilitetin dhe mbështetjen longitudinale.	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm – 5.00 mm, në rritje progresive (p.sh., 0.25 mm). Gjatësia e disponueshme: Të paktën 8/9 mm deri 38 mm, me mundësi të zgjatjes dhe mbështetje uniforme. Radiopaciteti: I garantuar me përdorimin e markuesveradiopak në të dy skajet e stentit.	0	6
-----	---	---	---	---	---

426	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme për forcë, radiopacitet dhe fleksibilitet. Lyerja: Polimerbioresorbues PLGA, me kohë të resorbimit ≤ 3 muaj nga implantimi. Bar i eluar: (Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus), me densitet doze të kontrolluar, për elutim të sinkronizuar. Dizajni i stentit: Dizajn me dy konektorë për segment, për të ruajtur fleksibilitetin dhe mbështetjen longitudinale.	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm – 5.00 mm, në rritje progresive (p.sh., 0.25 mm). Gjatësia e disponueshme: Të paktën 8/9 mm deri 38 mm, me mundësi të zgjatjes dhe mbështetje uniforme. Radiopaciteti: I garantuar me përdorimin e markuesveradiopak në të dy skajet e stentit.	0	1
-----	---	---	---	---	---

427	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme për forcë, radiopacitet dhe fleksibilitet. Lyerja: Polimerbioresorbues PLGA, me kohë të resorbimit ≤ 3 muaj nga implantimi. Bar i eluar: (Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus), me densitet doze të kontrolluar, për elutim të sinkronizuar. Dizajni i stentit: Dizajn me dy konektorë për segment, për të ruajtur fleksibilitetin dhe mbështetjen longitudinale.	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës ≤ 80 µm (nano-strut 70–85 µm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm – 5.00 mm, në rritje progresive (p.sh., 0.25 mm). Gjatësia e disponueshme: Të paktën 8/9 mm deri 38 mm, me mundësi të zgjatjes dhe mbështetje uniforme. Radiopaciteti: I garantuar me përdorimin e markuesveradiopak në të dy skajet e stentit.	0	4
-----	---	---	--	---	---

428	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme për forcë, radiopacitet dhe fleksibilitet. Lyerja: Polimerbioresorbues PLGA, me kohë të resorbimit ≤ 3 muaj nga implantimi. Bar i eluar: (Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus), me densitet doze të kontrolluar, për elutim të sinkronizuar. Dizajni i stentit: Dizajn me dy konektorë për segment, për të ruajtur fleksibilitetin dhe mbështetjen longitudinale.	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm – 5.00 mm, në rritje progresive (p.sh., 0.25 mm). Gjatësia e disponueshme: Të paktën 8/9 mm deri 38 mm, me mundësi të zgjatjes dhe mbështetje uniforme. Radiopaciteti: I garantuar me përdorimin e markuesveradiopak në të dy skajet e stentit.	0	12
-----	---	---	---	---	----

429	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme për forcë, radiopacitet dhe fleksibilitet. Lyerja: Polimerbioresorbues PLGA, me kohë të resorbimit ≤ 3 muaj nga implantimi. Bar i eluar: (Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus), me densitet doze të kontrolluar, për elutim të sinkronizuar. Dizajni i stentit: Dizajn me dy konektorë për segment, për të ruajtur fleksibilitetin dhe mbështetjen longitudinale.	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm – 5.00 mm, në rritje progresive (p.sh., 0.25 mm). Gjatësia e disponueshme: Të paktën 8/9 mm deri 38 mm, me mundësi të zgjatjes dhe mbështetje uniforme. Radiopaciteti: I garantuar me përdorimin e markuesveradiopak në të dy skajet e stentit.	0	15
-----	---	---	---	---	----

430	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme për forcë, radiopacitet dhe fleksibilitet. Lyerja: Polimerbioresorbues PLGA, me kohë të resorbimit ≤ 3 muaj nga implantimi. Bar i eluar: (Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus), me densitet doze të kontrolluar, për elutim të sinkronizuar. Dizajni i stentit: Dizajn me dy konektorë për segment, për të ruajtur fleksibilitetin dhe mbështetjen longitudinale.	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm – 5.00 mm, në rritje progresive (p.sh., 0.25 mm). Gjatësia e disponueshme: Të paktën 8/9 mm deri 38 mm, me mundësi të zgjatjes dhe mbështetje uniforme. Radiopaciteti: I garantuar me përdorimin e markuesveradiopak në të dy skajet e stentit.	0	9
-----	---	---	---	---	---

431	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme për forcë, radiopacitet dhe fleksibilitet. Lyerja: Polimerbioresorbues PLGA, me kohë të resorbimit ≤ 3 muaj nga implantimi. Bar i eluar: (Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus), me densitet doze të kontrolluar, për elutim të sinkronizuar. Dizajni i stentit: Dizajn me dy konektorë për segment, për të ruajtur fleksibilitetin dhe mbështetjen longitudinale.	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm – 5.00 mm, në rritje progresive (p.sh., 0.25 mm). Gjatësia e disponueshme: Të paktën 8/9 mm deri 38 mm, me mundësi të zgjatjes dhe mbështetje uniforme. Radiopaciteti: I garantuar me përdorimin e markuesveradiopak në të dy skajet e stentit.	0	2
-----	---	---	---	---	---

432	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme për forcë, radiopacitet dhe fleksibilitet. Lyerja: Polimerbioresorbues PLGA, me kohë të resorbimit ≤ 3 muaj nga implantimi. Bar i eluar: (Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus), me densitet doze të kontrolluar, për elutim të sinkronizuar. Dizajni i stentit: Dizajn me dy konektorë për segment, për të ruajtur fleksibilitetin dhe mbështetjen longitudinale.	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm – 5.00 mm, në rritje progresive (p.sh., 0.25 mm). Gjatësia e disponueshme: Të paktën 8/9 mm deri 38 mm, me mundësi të zgjatjes dhe mbështetje uniforme. Radiopaciteti: I garantuar me përdorimin e markuesveradiopak në të dy skajet e stentit.	0	4
-----	---	---	---	---	---

433	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme për forcë, radiopacitet dhe fleksibilitet. Lyerja: Polimerbioresorbues PLGA, me kohë të resorbimit ≤ 3 muaj nga implantimi. Bar i eluar: (Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus), me densitet doze të kontrolluar, për elutim të sinkronizuar. Dizajni i stentit: Dizajn me dy konektorë për segment, për të ruajtur fleksibilitetin dhe mbështetjen longitudinale.	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm – 5.00 mm, në rritje progresive (p.sh., 0.25 mm). Gjatësia e disponueshme: Të paktën 8/9 mm deri 38 mm, me mundësi të zgjatjes dhe mbështetje uniforme. Radiopaciteti: I garantuar me përdorimin e markuesveradiopak në të dy skajet e stentit.	0	10
-----	---	---	---	---	----

434	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme për forcë, radiopacitet dhe fleksibilitet. Lyerja: Polimerbioresorbues PLGA, me kohë të resorbimit ≤ 3 muaj nga implantimi. Bar i eluar: (Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus), me densitet doze të kontrolluar, për elutim të sinkronizuar. Dizajni i stentit: Dizajn me dy konektorë për segment, për të ruajtur fleksibilitetin dhe mbështetjen longitudinale.	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm – 5.00 mm, në rritje progresive (p.sh., 0.25 mm). Gjatësia e disponueshme: Të paktën 8/9 mm deri 38 mm, me mundësi të zgjatjes dhe mbështetje uniforme. Radiopaciteti: I garantuar me përdorimin e markuesveradiopak në të dy skajet e stentit.	0	1
-----	---	---	---	---	---

435	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme për forcë, radiopacitet dhe fleksibilitet. Lyerja: Polimerbioresorbues PLGA, me kohë të resorbimit ≤ 3 muaj nga implantimi. Bar i eluar: (Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus), me densitet doze të kontrolluar, për elutim të sinkronizuar. Dizajni i stentit: Dizajn me dy konektorë për segment, për të ruajtur fleksibilitetin dhe mbështetjen longitudinale.	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm – 5.00 mm, në rritje progresive (p.sh., 0.25 mm). Gjatësia e disponueshme: Të paktën 8/9 mm deri 38 mm, me mundësi të zgjatjes dhe mbështetje uniforme. Radiopaciteti: I garantuar me përdorimin e markuesveradiopak në të dy skajet e stentit.	0	1
-----	---	---	---	---	---

436	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme për forcë, radiopacitet dhe fleksibilitet. Lyerja: Polimerbioresorbues PLGA, me kohë të resorbimit ≤ 3 muaj nga implantimi. Bar i eluar: (Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus), me densitet doze të kontrolluar, për elutim të sinkronizuar. Dizajni i stentit: Dizajn me dy konektorë për segment, për të ruajtur fleksibilitetin dhe mbështetjen longitudinale.	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm – 5.00 mm, në rritje progresive (p.sh., 0.25 mm). Gjatësia e disponueshme: Të paktën 8/9 mm deri 38 mm, me mundësi të zgjatjes dhe mbështetje uniforme. Radiopaciteti: I garantuar me përdorimin e markuesveradiopak në të dy skajet e stentit.	0	3
-----	---	---	---	---	---

437	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme për forcë, radiopacitet dhe fleksibilitet. Lyerja: Polimerbioresorbues PLGA, me kohë të resorbimit ≤ 3 muaj nga implantimi. Bar i eluar: (Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus), me densitet doze të kontrolluar, për elutim të sinkronizuar. Dizajni i stentit: Dizajn me dy konektorë për segment, për të ruajtur fleksibilitetin dhe mbështetjen longitudinale.	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm – 5.00 mm, në rritje progresive (p.sh., 0.25 mm). Gjatësia e disponueshme: Të paktën 8/9 mm deri 38 mm, me mundësi të zgjatjes dhe mbështetje uniforme. Radiopaciteti: I garantuar me përdorimin e markuesveradiopak në të dy skajet e stentit.	0	3
-----	---	---	---	---	---

438	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme për forcë, radiopacitet dhe fleksibilitet. Lyerja: Polimerbioresorbues PLGA, me kohë të resorbimit ≤ 3 muaj nga implantimi. Bar i eluar: (Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus), me densitet doze të kontrolluar, për elutim të sinkronizuar. Dizajni i stentit: Dizajn me dy konektorë për segment, për të ruajtur fleksibilitetin dhe mbështetjen longitudinale.	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm – 5.00 mm, në rritje progresive (p.sh., 0.25 mm). Gjatësia e disponueshme: Të paktën 8/9 mm deri 38 mm, me mundësi të zgjatjes dhe mbështetje uniforme. Radiopaciteti: I garantuar me përdorimin e markuesveradiopak në të dy skajet e stentit.	0	3
-----	---	---	---	---	---

439	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme për forcë, radiopacitet dhe fleksibilitet. Lyerja: Polimerbioresorbues PLGA, me kohë të resorbimit ≤ 3 muaj nga implantimi. Bar i eluar: (Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus), me densitet doze të kontrolluar, për elutim të sinkronizuar. Dizajni i stentit: Dizajn me dy konektorë për segment, për të ruajtur fleksibilitetin dhe mbështetjen longitudinale.	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm – 5.00 mm, në rritje progresive (p.sh., 0.25 mm). Gjatësia e disponueshme: Të paktën 8/9 mm deri 38 mm, me mundësi të zgjatjes dhe mbështetje uniforme. Radiopaciteti: I garantuar me përdorimin e markuesveradiopak në të dy skajet e stentit.	0	2
-----	---	---	---	---	---

440	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme për forcë, radiopacitet dhe fleksibilitet. Lyerja: Polimerbioresorbues PLGA, me kohë të resorbimit ≤ 3 muaj nga implantimi. Bar i eluar: (Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus), me densitet doze të kontrolluar, për elutim të sinkronizuar. Dizajni i stentit: Dizajn me dy konektorë për segment, për të ruajtur fleksibilitetin dhe mbështetjen longitudinale.	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm – 5.00 mm, në rritje progresive (p.sh., 0.25 mm). Gjatësia e disponueshme: Të paktën 8/9 mm deri 38 mm, me mundësi të zgjatjes dhe mbështetje uniforme. Radiopaciteti: I garantuar me përdorimin e markuesveradiopak në të dy skajet e stentit.	0	2
-----	---	---	---	---	---

441	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme për forcë, radiopacitet dhe fleksibilitet. Lyerja: Polimerbioresorbues PLGA, me kohë të resorbimit ≤ 3 muaj nga implantimi. Bar i eluar: (Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus), me densitet doze të kontrolluar, për elutim të sinkronizuar. Dizajni i stentit: Dizajn me dy konektorë për segment, për të ruajtur fleksibilitetin dhe mbështetjen longitudinale.	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm – 5.00 mm, në rritje progresive (p.sh., 0.25 mm). Gjatësia e disponueshme: Të paktën 8/9 mm deri 38 mm, me mundësi të zgjatjes dhe mbështetje uniforme. Radiopaciteti: I garantuar me përdorimin e markuesveradiopak në të dy skajet e stentit.	0	1
-----	---	---	---	---	---

442	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme për forcë, radiopacitet dhe fleksibilitet. Lyerja: Polimerbioresorbues PLGA, me kohë të resorbimit ≤ 3 muaj nga implantimi. Bar i eluar: (Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus), me densitet doze të kontrolluar, për elutim të sinkronizuar. Dizajni i stentit: Dizajn me dy konektorë për segment, për të ruajtur fleksibilitetin dhe mbështetjen longitudinale.	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm – 5.00 mm, në rritje progresive (p.sh., 0.25 mm). Gjatësia e disponueshme: Të paktën 8/9 mm deri 38 mm, me mundësi të zgjatjes dhe mbështetje uniforme. Radiopaciteti: I garantuar me përdorimin e markuesveradiopak në të dy skajet e stentit.	0	6
-----	---	---	---	---	---

443	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme për forcë, radiopacitet dhe fleksibilitet. Lyerja: Polimerbioresorbues PLGA, me kohë të resorbimit ≤ 3 muaj nga implantimi. Bar i eluar: (Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus), me densitet doze të kontrolluar, për elutim të sinkronizuar. Dizajni i stentit: Dizajn me dy konektorë për segment, për të ruajtur fleksibilitetin dhe mbështetjen longitudinale.	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm – 5.00 mm, në rritje progresive (p.sh., 0.25 mm). Gjatësia e disponueshme: Të paktën 8/9 mm deri 38 mm, me mundësi të zgjatjes dhe mbështetje uniforme. Radiopaciteti: I garantuar me përdorimin e markuesveradiopak në të dy skajet e stentit.	0	2
-----	---	---	---	---	---

444	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme për forcë, radiopacitet dhe fleksibilitet. Lyerja: Polimerbioresorbues PLGA, me kohë të resorbimit ≤ 3 muaj nga implantimi. Bar i eluar: (Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus), me densitet doze të kontrolluar, për elutim të sinkronizuar. Dizajni i stentit: Dizajn me dy konektorë për segment, për të ruajtur fleksibilitetin dhe mbështetjen longitudinale.	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm – 5.00 mm, në rritje progresive (p.sh., 0.25 mm). Gjatësia e disponueshme: Të paktën 8/9 mm deri 38 mm, me mundësi të zgjatjes dhe mbështetje uniforme. Radiopaciteti: I garantuar me përdorimin e markuesveradiopak në të dy skajet e stentit.	0	3
-----	---	---	---	---	---

445	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme për forcë, radiopacitet dhe fleksibilitet. Lyerja: Polimerbioresorbues PLGA, me kohë të resorbimit ≤ 3 muaj nga implantimi. Bar i eluar: (Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus), me densitet doze të kontrolluar, për elutim të sinkronizuar. Dizajni i stentit: Dizajn me dy konektorë për segment, për të ruajtur fleksibilitetin dhe mbështetjen longitudinale.	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm – 5.00 mm, në rritje progresive (p.sh., 0.25 mm). Gjatësia e disponueshme: Të paktën 8/9 mm deri 38 mm, me mundësi të zgjatjes dhe mbështetje uniforme. Radiopaciteti: I garantuar me përdorimin e markuesveradiopak në të dy skajet e stentit.	0	4
-----	---	---	---	---	---

446	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme për forcë, radiopacitet dhe fleksibilitet. Lyerja: Polimerbioresorbues PLGA, me kohë të resorbimit ≤ 3 muaj nga implantimi. Bar i eluar: (Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus), me densitet doze të kontrolluar, për elutim të sinkronizuar. Dizajni i stentit: Dizajn me dy konektorë për segment, për të ruajtur fleksibilitetin dhe mbështetjen longitudinale.	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm – 5.00 mm, në rritje progresive (p.sh., 0.25 mm). Gjatësia e disponueshme: Të paktën 8/9 mm deri 38 mm, me mundësi të zgjatjes dhe mbështetje uniforme. Radiopaciteti: I garantuar me përdorimin e markuesveradiopak në të dy skajet e stentit.	0	3
-----	---	---	---	---	---

447	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme për forcë, radiopacitet dhe fleksibilitet. Lyerja: Polimerbioresorbues PLGA, me kohë të resorbimit ≤ 3 muaj nga implantimi. Bar i eluar: (Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus), me densitet doze të kontrolluar, për elutim të sinkronizuar. Dizajni i stentit: Dizajn me dy konektorë për segment, për të ruajtur fleksibilitetin dhe mbështetjen longitudinale.	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm – 5.00 mm, në rritje progresive (p.sh., 0.25 mm). Gjatësia e disponueshme: Të paktën 8/9 mm deri 38 mm, me mundësi të zgjatjes dhe mbështetje uniforme. Radiopaciteti: I garantuar me përdorimin e markuesveradiopak në të dy skajet e stentit.	0	14
-----	---	---	---	---	----

448	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme për forcë, radiopacitet dhe fleksibilitet. Lyerja: Polimerbioresorbues PLGA, me kohë të resorbimit ≤ 3 muaj nga implantimi. Bar i eluar: (Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus), me densitet doze të kontrolluar, për elutim të sinkronizuar. Dizajni i stentit: Dizajn me dy konektorë për segment, për të ruajtur fleksibilitetin dhe mbështetjen longitudinale.	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm – 5.00 mm, në rritje progresive (p.sh., 0.25 mm). Gjatësia e disponueshme: Të paktën 8/9 mm deri 38 mm, me mundësi të zgjatjes dhe mbështetje uniforme. Radiopaciteti: I garantuar me përdorimin e markuesveradiopak në të dy skajet e stentit.	0	1
-----	---	---	---	---	---

449	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme për forcë, radiopacitet dhe fleksibilitet. Lyerja: Polimerbioresorbues PLGA, me kohë të resorbimit ≤ 3 muaj nga implantimi. Bar i eluar: (Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus), me densitet doze të kontrolluar, për elutim të sinkronizuar. Dizajni i stentit: Dizajn me dy konektorë për segment, për të ruajtur fleksibilitetin dhe mbështetjen longitudinale.	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm – 5.00 mm, në rritje progresive (p.sh., 0.25 mm). Gjatësia e disponueshme: Të paktën 8/9 mm deri 38 mm, me mundësi të zgjatjes dhe mbështetje uniforme. Radiopaciteti: I garantuar me përdorimin e markuesveradiopak në të dy skajet e stentit.	0	5
-----	---	---	---	---	---

450	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme për forcë, radiopacitet dhe fleksibilitet. Lyerja: Polimerbioresorbues PLGA, me kohë të resorbimit ≤ 3 muaj nga implantimi. Bar i eluar: (Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus), me densitet doze të kontrolluar, për elutim të sinkronizuar. Dizajni i stentit: Dizajn me dy konektorë për segment, për të ruajtur fleksibilitetin dhe mbështetjen longitudinale.	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm – 5.00 mm, në rritje progresive (p.sh., 0.25 mm). Gjatësia e disponueshme: Të paktën 8/9 mm deri 38 mm, me mundësi të zgjatjes dhe mbështetje uniforme. Radiopaciteti: I garantuar me përdorimin e markuesveradiopak në të dy skajet e stentit.	0	1
-----	---	---	---	---	---

451	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme për forcë, radiopacitet dhe fleksibilitet. Lyerja: Polimerbioresorbues PLGA, me kohë të resorbimit ≤ 3 muaj nga implantimi. Bar i eluar: (Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus), me densitet doze të kontrolluar, për elutim të sinkronizuar. Dizajni i stentit: Dizajn me dy konektorë për segment, për të ruajtur fleksibilitetin dhe mbështetjen longitudinale.	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës ≤ 80 µm (nano-strut 70–85 µm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm – 5.00 mm, në rritje progresive (p.sh., 0.25 mm). Gjatësia e disponueshme: Të paktën 8/9 mm deri 38 mm, me mundësi të zgjatjes dhe mbështetje uniforme. Radiopaciteti: I garantuar me përdorimin e markuesveradiopak në të dy skajet e stentit.	0	3
-----	---	---	--	---	---

452	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme për forcë, radiopacitet dhe fleksibilitet. Lyerja: Polimerbioresorbues PLGA, me kohë të resorbimit ≤ 3 muaj nga implantimi. Bar i eluar: (Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus), me densitet doze të kontrolluar, për elutim të sinkronizuar. Dizajni i stentit: Dizajn me dy konektorë për segment, për të ruajtur fleksibilitetin dhe mbështetjen longitudinale.	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm – 5.00 mm, në rritje progresive (p.sh., 0.25 mm). Gjatësia e disponueshme: Të paktën 8/9 mm deri 38 mm, me mundësi të zgjatjes dhe mbështetje uniforme. Radiopaciteti: I garantuar me përdorimin e markuesveradiopak në të dy skajet e stentit.	0	2
-----	---	---	---	---	---

453	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme për forcë, radiopacitet dhe fleksibilitet. Lyerja: Polimerbioresorbues PLGA, me kohë të resorbimit ≤ 3 muaj nga implantimi. Bar i eluar: (Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus), me densitet doze të kontrolluar, për elutim të sinkronizuar. Dizajni i stentit: Dizajn me dy konektorë për segment, për të ruajtur fleksibilitetin dhe mbështetjen longitudinale.	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm – 5.00 mm, në rritje progresive (p.sh., 0.25 mm). Gjatësia e disponueshme: Të paktën 8/9 mm deri 38 mm, me mundësi të zgjatjes dhe mbështetje uniforme. Radiopaciteti: I garantuar me përdorimin e markuesveradiopak në të dy skajet e stentit.	0	6
-----	---	---	---	---	---

454	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme për forcë, radiopacitet dhe fleksibilitet. Lyerja: Polimerbioresorbues PLGA, me kohë të resorbimit ≤ 3 muaj nga implantimi. Bar i eluar: (Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus), me densitet doze të kontrolluar, për elutim të sinkronizuar. Dizajni i stentit: Dizajn me dy konektorë për segment, për të ruajtur fleksibilitetin dhe mbështetjen longitudinale.	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm – 5.00 mm, në rritje progresive (p.sh., 0.25 mm). Gjatësia e disponueshme: Të paktën 8/9 mm deri 38 mm, me mundësi të zgjatjes dhe mbështetje uniforme. Radiopaciteti: I garantuar me përdorimin e markuesveradiopak në të dy skajet e stentit.	0	50
-----	---	---	---	---	----

455	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme për forcë, radiopacitet dhe fleksibilitet. Lyerja: Polimerbioresorbues PLGA, me kohë të resorbimit ≤ 3 muaj nga implantimi. Bar i eluar: (Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus), me densitet doze të kontrolluar, për elutim të sinkronizuar. Dizajni i stentit: Dizajn me dy konektorë për segment, për të ruajtur fleksibilitetin dhe mbështetjen longitudinale.	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm – 5.00 mm, në rritje progresive (p.sh., 0.25 mm). Gjatësia e disponueshme: Të paktën 8/9 mm deri 38 mm, me mundësi të zgjatjes dhe mbështetje uniforme. Radiopaciteti: I garantuar me përdorimin e markuesveradiopak në të dy skajet e stentit.	0	2
-----	---	---	---	---	---

456	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme për forcë, radiopacitet dhe fleksibilitet. Lyerja: Polimer bioresorbues PLGA, me kohë të resorbimit ≤ 3 muaj nga implantimi. Bar i eluar: (Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus), me densitet doze të kontrolluar, për elutim të sinkronizuar. Dizajni i stentit: Dizajn me dy konektorë për segment, për të ruajtur fleksibilitetin dhe mbështetjen longitudinale.	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm – 5.00 mm, në rritje progresive (p.sh., 0.25 mm). Gjatësia e disponueshme: Të paktën 8/9 mm deri 38 mm, me mundësi të zgjatjes dhe mbështetje uniforme. Radiopaciteti: I garantuar me përdorimin e markuesveradiopak në të dy skajet e stentit.	0	2
-----	---	--	---	---	---

457	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme për forcë, radiopacitet dhe fleksibilitet. Lyerja: Polimerbioresorbues PLGA, me kohë të resorbimit ≤ 3 muaj nga implantimi. Bar i eluar: (Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus), me densitet doze të kontrolluar, për elutim të sinkronizuar. Dizajni i stentit: Dizajn me dy konektorë për segment, për të ruajtur fleksibilitetin dhe mbështetjen longitudinale.	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm – 5.00 mm, në rritje progresive (p.sh., 0.25 mm). Gjatësia e disponueshme: Të paktën 8/9 mm deri 38 mm, me mundësi të zgjatjes dhe mbështetje uniforme. Radiopaciteti: I garantuar me përdorimin e markuesveradiopak në të dy skajet e stentit.	0	14
-----	---	---	---	---	----

458	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme për forcë, radiopacitet dhe fleksibilitet. Lyerja: Polimerbioresorbues PLGA, me kohë të resorbimit ≤ 3 muaj nga implantimi. Bar i eluar: (Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus), me densitet doze të kontrolluar, për elutim të sinkronizuar. Dizajni i stentit: Dizajn me dy konektorë për segment, për të ruajtur fleksibilitetin dhe mbështetjen longitudinale.	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm – 5.00 mm, në rritje progresive (p.sh., 0.25 mm). Gjatësia e disponueshme: Të paktën 8/9 mm deri 38 mm, me mundësi të zgjatjes dhe mbështetje uniforme. Radiopaciteti: I garantuar me përdorimin e markuesveradiopak në të dy skajet e stentit.	0	5
-----	---	---	---	---	---

459	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme për forcë, radiopacitet dhe fleksibilitet. Lyerja: Polimerbioresorbues PLGA, me kohë të resorbimit ≤ 3 muaj nga implantimi. Bar i eluar: (Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus), me densitet doze të kontrolluar, për elutim të sinkronizuar. Dizajni i stentit: Dizajn me dy konektorë për segment, për të ruajtur fleksibilitetin dhe mbështetjen longitudinale.	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm – 5.00 mm, në rritje progresive (p.sh., 0.25 mm). Gjatësia e disponueshme: Të paktën 8/9 mm deri 38 mm, me mundësi të zgjatjes dhe mbështetje uniforme. Radiopaciteti: I garantuar me përdorimin e markuesveradiopak në të dy skajet e stentit.	0	5
-----	---	---	---	---	---

460	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme për forcë, radiopacitet dhe fleksibilitet. Lyerja: Polimerbioresorbues PLGA, me kohë të resorbimit ≤ 3 muaj nga implantimi. Bar i eluar: (Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus), me densitet doze të kontrolluar, për elutim të sinkronizuar. Dizajni i stentit: Dizajn me dy konektorë për segment, për të ruajtur fleksibilitetin dhe mbështetjen longitudinale.	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm – 5.00 mm, në rritje progresive (p.sh., 0.25 mm). Gjatësia e disponueshme: Të paktën 8/9 mm deri 38 mm, me mundësi të zgjatjes dhe mbështetje uniforme. Radiopaciteti: I garantuar me përdorimin e markuesveradiopak në të dy skajet e stentit.	0	3
-----	---	---	---	---	---

461	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme për forcë, radiopacitet dhe fleksibilitet. Lyerja: Polimerbioresorbues PLGA, me kohë të resorbimit ≤ 3 muaj nga implantimi. Bar i eluar: (Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus), me densitet doze të kontrolluar, për elutim të sinkronizuar. Dizajni i stentit: Dizajn me dy konektorë për segment, për të ruajtur fleksibilitetin dhe mbështetjen longitudinale.	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm – 5.00 mm, në rritje progresive (p.sh., 0.25 mm). Gjatësia e disponueshme: Të paktën 8/9 mm deri 38 mm, me mundësi të zgjatjes dhe mbështetje uniforme. Radiopaciteti: I garantuar me përdorimin e markuesveradiopak në të dy skajet e stentit.	0	1
-----	---	---	---	---	---

462	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme për forcë, radiopacitet dhe fleksibilitet. Lyerja: Polimerbioresorbues PLGA, me kohë të resorbimit ≤ 3 muaj nga implantimi. Bar i eluar: (Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus), me densitet doze të kontrolluar, për elutim të sinkronizuar. Dizajni i stentit: Dizajn me dy konektorë për segment, për të ruajtur fleksibilitetin dhe mbështetjen longitudinale.	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm – 5.00 mm, në rritje progresive (p.sh., 0.25 mm). Gjatësia e disponueshme: Të paktën 8/9 mm deri 38 mm, me mundësi të zgjatjes dhe mbështetje uniforme. Radiopaciteti: I garantuar me përdorimin e markuesveradiopak në të dy skajet e stentit.	0	1
-----	---	---	---	---	---

463	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme për forcë, radiopacitet dhe fleksibilitet. Lyerja: Polimerbioresorbues PLGA, me kohë të resorbimit ≤ 3 muaj nga implantimi. Bar i eluar: (Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus), me densitet doze të kontrolluar, për elutim të sinkronizuar. Dizajni i stentit: Dizajn me dy konektorë për segment, për të ruajtur fleksibilitetin dhe mbështetjen longitudinale.	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm – 5.00 mm, në rritje progresive (p.sh., 0.25 mm). Gjatësia e disponueshme: Të paktën 8/9 mm deri 38 mm, me mundësi të zgjatjes dhe mbështetje uniforme. Radiopaciteti: I garantuar me përdorimin e markuesveradiopak në të dy skajet e stentit.	0	2
-----	---	---	---	---	---

464	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme për forcë, radiopacitet dhe fleksibilitet. Lyerja: Polimerbioresorbues PLGA, me kohë të resorbimit ≤ 3 muaj nga implantimi. Bar i eluar: (Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus), me densitet doze të kontrolluar, për elutim të sinkronizuar. Dizajni i stentit: Dizajn me dy konektorë për segment, për të ruajtur fleksibilitetin dhe mbështetjen longitudinale.	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm – 5.00 mm, në rritje progresive (p.sh., 0.25 mm). Gjatësia e disponueshme: Të paktën 8/9 mm deri 38 mm, me mundësi të zgjatjes dhe mbështetje uniforme. Radiopaciteti: I garantuar me përdorimin e markuesveradiopak në të dy skajet e stentit.	0	1
-----	---	---	---	---	---

465	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme për forcë, radiopacitet dhe fleksibilitet. Lyerja: Polimerbioresorbues PLGA, me kohë të resorbimit ≤ 3 muaj nga implantimi. Bar i eluar: (Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus), me densitet doze të kontrolluar, për elutim të sinkronizuar. Dizajni i stentit: Dizajn me dy konektorë për segment, për të ruajtur fleksibilitetin dhe mbështetjen longitudinale.	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm – 5.00 mm, në rritje progresive (p.sh., 0.25 mm). Gjatësia e disponueshme: Të paktën 8/9 mm deri 38 mm, me mundësi të zgjatjes dhe mbështetje uniforme. Radiopaciteti: I garantuar me përdorimin e markuesveradiopak në të dy skajet e stentit.	0	3
-----	---	---	---	---	---

466	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme për forcë, radiopacitet dhe fleksibilitet. Lyerja: Polimerbioresorbues PLGA, me kohë të resorbimit ≤ 3 muaj nga implantimi. Bar i eluar: (Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus), me densitet doze të kontrolluar, për elutim të sinkronizuar. Dizajni i stentit: Dizajn me dy konektorë për segment, për të ruajtur fleksibilitetin dhe mbështetjen longitudinale.	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm – 5.00 mm, në rritje progresive (p.sh., 0.25 mm). Gjatësia e disponueshme: Të paktën 8/9 mm deri 38 mm, me mundësi të zgjatjes dhe mbështetje uniforme. Radiopaciteti: I garantuar me përdorimin e markuesveradiopak në të dy skajet e stentit.	0	5
-----	---	---	---	---	---

467	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme për forcë, radiopacitet dhe fleksibilitet. Lyerja: Polimerbioresorbues PLGA, me kohë të resorbimit ≤ 3 muaj nga implantimi. Bar i eluar: (Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus), me densitet doze të kontrolluar, për elutim të sinkronizuar. Dizajni i stentit: Dizajn me dy konektorë për segment, për të ruajtur fleksibilitetin dhe mbështetjen longitudinale.	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut 70–85 μm). Diametri i disponueshëm: 2.25 mm – 5.00 mm, në rritje progresive (p.sh., 0.25 mm). Gjatësia e disponueshme: Të paktën 8/9 mm deri 38 mm, me mundësi të zgjatjes dhe mbështetje uniforme. Radiopaciteti: I garantuar me përdorimin e markuesveradiopak në të dy skajet e stentit.	0	15
-----	---	---	---	---	----

468	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit: Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një citostatiku të familjes Limus: Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus ose Biolimus. Mbështjellja e stentit: Pa polimer, ose Me polimer biodegradues, i cili shkrihet brenda ≤ 3 muajve pas implantimit.	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr) Materialet duhet të ofrojnë: Radiopacitet të lartë Forcë strukturore Fleksibilitet dhe kalueshmëri të mirë në arterie Trashësia e strutës: ≤ 90 mikrometër (μm) Dimensionet e kërkuara: Diametri i stentit: minimumi 2.25 mm deri minimumi 4.00 mm Gjatësia e stentit: minimumi 8/9 mm deri minimumi 36 mm	0	9
469	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit: Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një citostatiku të familjes Limus: Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus ose Biolimus. Mbështjellja e stentit: Pa polimer, ose Me polimer biodegradues, i cili shkrihet brenda ≤ 3 muajve pas implantimit.	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr) Materialet duhet të ofrojnë: Radiopacitet të lartë Forcë strukturore Fleksibilitet dhe kalueshmëri të mirë në arterie Trashësia e strutës: ≤ 90 mikrometër (μm) Dimensionet e kërkuara: Diametri i stentit: minimumi 2.25 mm deri minimumi 4.00 mm Gjatësia e stentit: minimumi 8/9 mm deri minimumi 36 mm	0	2

470	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit: Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një citostatiku të familjes Limus: Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus ose Biolimus. Mbështjellja e stentit: Pa polimer, ose Me polimer biodegradues, i cili shkrihet brenda ≤ 3 muajve pas implantimit.	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr) Materialet duhet të ofrojnë: Radiopacitet të lartë Forcë strukturore Fleksibilitet dhe kalueshmëri të mirë në arterie Trashësia e strutës: ≤ 90 mikrometër (μm) Dimensionet e kërkuara: Diametri i stentit: minimumi 2.25 mm deri minimumi 4.00 mm Gjatësia e stentit: minimumi 8/9 mm deri minimumi 36 mm	0	4
471	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit: Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një citostatiku të familjes Limus: Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus ose Biolimus. Mbështjellja e stentit: Pa polimer, ose Me polimer biodegradues, i cili shkrihet brenda ≤ 3 muajve pas implantimit.	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr) Materialet duhet të ofrojnë: Radiopacitet të lartë Forcë strukturore Fleksibilitet dhe kalueshmëri të mirë në arterie Trashësia e strutës: ≤ 90 mikrometër (μm) Dimensionet e kërkuara: Diametri i stentit: minimumi 2.25 mm deri minimumi 4.00 mm Gjatësia e stentit: minimumi 8/9 mm deri minimumi 36 mm	0	9

472	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit: Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një citostatiku të familjes Limus: Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus ose Biolimus. Mbështjellja e stentit: Pa polimer, ose Me polimer biodegradues, i cili shkrihet brenda ≤ 3 muajve pas implantimit.	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr) Materialet duhet të ofrojnë: Radiopacitet të lartë Forcë strukturore Fleksibilitet dhe kalueshmëri të mirë në arterie Trashësia e strutës: ≤ 90 mikrometër (μm) Dimensionet e kërkuara: Diametri i stentit: minimumi 2.25 mm deri minimumi 4.00 mm Gjatësia e stentit: minimumi 8/9 mm deri minimumi 36 mm	0	1
473	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit: Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një citostatiku të familjes Limus: Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus ose Biolimus. Mbështjellja e stentit: Pa polimer, ose Me polimer biodegradues, i cili shkrihet brenda ≤ 3 muajve pas implantimit.	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr) Materialet duhet të ofrojnë: Radiopacitet të lartë Forcë strukturore Fleksibilitet dhe kalueshmëri të mirë në arterie Trashësia e strutës: ≤ 90 mikrometër (μm) Dimensionet e kërkuara: Diametri i stentit: minimumi 2.25 mm deri minimumi 4.00 mm Gjatësia e stentit: minimumi 8/9 mm deri minimumi 36 mm	0	3

474	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit: Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një citostatiku të familjes Limus: Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus ose Biolimus. Mbështjellja e stentit: Pa polimer, ose Me polimer biodegradues, i cili shkrihet brenda ≤ 3 muajve pas implantimit.	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr) Materialet duhet të ofrojnë: Radiopacitet të lartë Forcë strukturore Fleksibilitet dhe kalueshmëri të mirë në arterie Trashësia e strutës: ≤ 90 mikrometër (μm) Dimensionet e kërkuara: Diametri i stentit: minimumi 2.25 mm deri minimumi 4.00 mm Gjatësia e stentit: minimumi 8/9 mm deri minimumi 36 mm	0	3
475	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit: Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një citostatiku të familjes Limus: Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus ose Biolimus. Mbështjellja e stentit: Pa polimer, ose Me polimer biodegradues, i cili shkrihet brenda ≤ 3 muajve pas implantimit.	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr) Materialet duhet të ofrojnë: Radiopacitet të lartë Forcë strukturore Fleksibilitet dhe kalueshmëri të mirë në arterie Trashësia e strutës: ≤ 90 mikrometër (μm) Dimensionet e kërkuara: Diametri i stentit: minimumi 2.25 mm deri minimumi 4.00 mm Gjatësia e stentit: minimumi 8/9 mm deri minimumi 36 mm	0	1

476	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit: Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një citostatiku të familjes Limus: Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus ose Biolimus. Mbështjellja e stentit: Pa polimer, ose Me polimer biodegradues, i cili shkrihet brenda ≤ 3 muajve pas implantimit.	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr) Materialet duhet të ofrojnë: Radiopacitet të lartë Forcë strukturore Fleksibilitet dhe kalueshmëri të mirë në arterie Trashësia e strutës: ≤ 90 mikrometër (μm) Dimensionet e kërkuara: Diametri i stentit: minimumi 2.25 mm deri minimumi 4.00 mm Gjatësia e stentit: minimumi 8/9 mm deri minimumi 36 mm	0	5
477	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit: Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një citostatiku të familjes Limus: Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus ose Biolimus. Mbështjellja e stentit: Pa polimer, ose Me polimer biodegradues, i cili shkrihet brenda ≤ 3 muajve pas implantimit.	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr) Materialet duhet të ofrojnë: Radiopacitet të lartë Forcë strukturore Fleksibilitet dhe kalueshmëri të mirë në arterie Trashësia e strutës: ≤ 90 mikrometër (μm) Dimensionet e kërkuara: Diametri i stentit: minimumi 2.25 mm deri minimumi 4.00 mm Gjatësia e stentit: minimumi 8/9 mm deri minimumi 36 mm	0	4

478	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit: Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një citostatiku të familjes Limus: Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus ose Biolimus. Mbështjellja e stentit: Pa polimer, ose Me polimer biodegradues, i cili shkrihet brenda ≤ 3 muajve pas implantimit.	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr) Materialet duhet të ofrojnë: Radiopacitet të lartë Forcë strukturore Fleksibilitet dhe kalueshmëri të mirë në arterie Trashësia e strutës: ≤ 90 mikrometër (μm) Dimensionet e kërkuara: Diametri i stentit: minimumi 2.25 mm deri minimumi 4.00 mm Gjatësia e stentit: minimumi 8/9 mm deri minimumi 36 mm	0	8
479	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit: Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një citostatiku të familjes Limus: Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus ose Biolimus. Mbështjellja e stentit: Pa polimer, ose Me polimer biodegradues, i cili shkrihet brenda ≤ 3 muajve pas implantimit.	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr) Materialet duhet të ofrojnë: Radiopacitet të lartë Forcë strukturore Fleksibilitet dhe kalueshmëri të mirë në arterie Trashësia e strutës: ≤ 90 mikrometër (μm) Dimensionet e kërkuara: Diametri i stentit: minimumi 2.25 mm deri minimumi 4.00 mm Gjatësia e stentit: minimumi 8/9 mm deri minimumi 36 mm	0	1

480	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit: Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një citostatiku të familjes Limus: Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus ose Biolimus. Mbështjellja e stentit: Pa polimer, ose Me polimer biodegradues, i cili shkrihet brenda ≤ 3 muajve pas implantimit.	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr) Materialet duhet të ofrojnë: Radiopacitet të lartë Forcë strukturore Fleksibilitet dhe kalueshmëri të mirë në arterie Trashësia e strutës: ≤ 90 mikrometër (μm) Dimensionet e kërkuara: Diametri i stentit: minimumi 2.25 mm deri minimumi 4.00 mm Gjatësia e stentit: minimumi 8/9 mm deri minimumi 36 mm	0	8
481	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit: Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një citostatiku të familjes Limus: Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus ose Biolimus. Mbështjellja e stentit: Pa polimer, ose Me polimer biodegradues, i cili shkrihet brenda ≤ 3 muajve pas implantimit.	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr) Materialet duhet të ofrojnë: Radiopacitet të lartë Forcë strukturore Fleksibilitet dhe kalueshmëri të mirë në arterie Trashësia e strutës: ≤ 90 mikrometër (μm) Dimensionet e kërkuara: Diametri i stentit: minimumi 2.25 mm deri minimumi 4.00 mm Gjatësia e stentit: minimumi 8/9 mm deri minimumi 36 mm	0	2

482	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit: Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një citostatiku të familjes Limus: Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus ose Biolimus. Mbështjellja e stentit: Pa polimer, ose Me polimer biodegradues, i cili shkrihet brenda ≤ 3 muajve pas implantimit.	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr) Materialet duhet të ofrojnë: Radiopacitet të lartë Forcë strukturore Fleksibilitet dhe kalueshmëri të mirë në arterie Trashësia e strutës: ≤ 90 mikrometër (μm) Dimensionet e kërkuara: Diametri i stentit: minimumi 2.25 mm deri minimumi 4.00 mm Gjatësia e stentit: minimumi 8/9 mm deri minimumi 36 mm	0	4
483	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit: Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një citostatiku të familjes Limus: Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus ose Biolimus. Mbështjellja e stentit: Pa polimer, ose Me polimer biodegradues, i cili shkrihet brenda ≤ 3 muajve pas implantimit.	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr) Materialet duhet të ofrojnë: Radiopacitet të lartë Forcë strukturore Fleksibilitet dhe kalueshmëri të mirë në arterie Trashësia e strutës: ≤ 90 mikrometër (μm) Dimensionet e kërkuara: Diametri i stentit: minimumi 2.25 mm deri minimumi 4.00 mm Gjatësia e stentit: minimumi 8/9 mm deri minimumi 36 mm	0	1

484	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit: Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një citostatiku të familjes Limus: Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus ose Biolimus. Mbështjellja e stentit: Pa polimer, ose Me polimer biodegradues, i cili shkrihet brenda ≤ 3 muajve pas implantimit.	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr) Materialet duhet të ofrojnë: Radiopacitet të lartë Forcë strukturore Fleksibilitet dhe kalueshmëri të mirë në arterie Trashësia e strutës: ≤ 90 mikrometër (μm) Dimensionet e kërkuara: Diametri i stentit: minimumi 2.25 mm deri minimumi 4.00 mm Gjatësia e stentit: minimumi 8/9 mm deri minimumi 36 mm	0	2
485	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit: Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një citostatiku të familjes Limus: Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus ose Biolimus. Mbështjellja e stentit: Pa polimer, ose Me polimer biodegradues, i cili shkrihet brenda ≤ 3 muajve pas implantimit.	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr) Materialet duhet të ofrojnë: Radiopacitet të lartë Forcë strukturore Fleksibilitet dhe kalueshmëri të mirë në arterie Trashësia e strutës: ≤ 90 mikrometër (μm) Dimensionet e kërkuara: Diametri i stentit: minimumi 2.25 mm deri minimumi 4.00 mm Gjatësia e stentit: minimumi 8/9 mm deri minimumi 36 mm	0	1

486	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit: Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një citostatiku të familjes Limus: Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus ose Biolimus. Mbështjellja e stentit: Pa polimer, ose Me polimer biodegradues, i cili shkrihet brenda ≤ 3 muajve pas implantimit.	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr) Materialet duhet të ofrojnë: Radiopacitet të lartë Forcë strukturore Fleksibilitet dhe kalueshmëri të mirë në arterie Trashësia e strutës: ≤ 90 mikrometër (μm) Dimensionet e kërkuara: Diametri i stentit: minimumi 2.25 mm deri minimumi 4.00 mm Gjatësia e stentit: minimumi 8/9 mm deri minimumi 36 mm	0	2
487	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit: Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një citostatiku të familjes Limus: Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus ose Biolimus. Mbështjellja e stentit: Pa polimer, ose Me polimer biodegradues, i cili shkrihet brenda ≤ 3 muajve pas implantimit.	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr) Materialet duhet të ofrojnë: Radiopacitet të lartë Forcë strukturore Fleksibilitet dhe kalueshmëri të mirë në arterie Trashësia e strutës: ≤ 90 mikrometër (μm) Dimensionet e kërkuara: Diametri i stentit: minimumi 2.25 mm deri minimumi 4.00 mm Gjatësia e stentit: minimumi 8/9 mm deri minimumi 36 mm	0	2

488	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit: Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një citostatiku të familjes Limus: Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus ose Biolimus. Mbështjellja e stentit: Pa polimer, ose Me polimer biodegradues, i cili shkrihet brenda ≤ 3 muajve pas implantimit.	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr) Materialet duhet të ofrojnë: Radiopacitet të lartë Forcë strukturore Fleksibilitet dhe kalueshmëri të mirë në arterie Trashësia e strutës: ≤ 90 mikrometër (μm) Dimensionet e kërkuara: Diametri i stentit: minimumi 2.25 mm deri minimumi 4.00 mm Gjatësia e stentit: minimumi 8/9 mm deri minimumi 36 mm	0	6
489	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit: Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një citostatiku të familjes Limus: Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus ose Biolimus. Mbështjellja e stentit: Pa polimer, ose Me polimer biodegradues, i cili shkrihet brenda ≤ 3 muajve pas implantimit.	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr) Materialet duhet të ofrojnë: Radiopacitet të lartë Forcë strukturore Fleksibilitet dhe kalueshmëri të mirë në arterie Trashësia e strutës: ≤ 90 mikrometër (μm) Dimensionet e kërkuara: Diametri i stentit: minimumi 2.25 mm deri minimumi 4.00 mm Gjatësia e stentit: minimumi 8/9 mm deri minimumi 36 mm	0	5

490	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit: Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një citostatiku të familjes Limus: Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus ose Biolimus. Mbështjellja e stentit: Pa polimer, ose Me polimer biodegradues, i cili shkrihet brenda ≤ 3 muajve pas implantimit.	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr) Materialet duhet të ofrojnë: Radiopacitet të lartë Forcë strukturore Fleksibilitet dhe kalueshmëri të mirë në arterie Trashësia e strutës: ≤ 90 mikrometër (μm) Dimensionet e kërkuara: Diametri i stentit: minimumi 2.25 mm deri minimumi 4.00 mm Gjatësia e stentit: minimumi 8/9 mm deri minimumi 36 mm	0	1
491	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit: Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një citostatiku të familjes Limus: Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus ose Biolimus. Mbështjellja e stentit: Pa polimer, ose Me polimer biodegradues, i cili shkrihet brenda ≤ 3 muajve pas implantimit.	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr) Materialet duhet të ofrojnë: Radiopacitet të lartë Forcë strukturore Fleksibilitet dhe kalueshmëri të mirë në arterie Trashësia e strutës: ≤ 90 mikrometër (μm) Dimensionet e kërkuara: Diametri i stentit: minimumi 2.25 mm deri minimumi 4.00 mm Gjatësia e stentit: minimumi 8/9 mm deri minimumi 36 mm	0	2

492	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit: Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një citostatiku të familjes Limus: Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus ose Biolimus. Mbështjellja e stentit: Pa polimer, ose Me polimer biodegradues, i cili shkrihet brenda ≤ 3 muajve pas implantimit.	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr) Materialet duhet të ofrojnë: Radiopacitet të lartë Forcë strukturore Fleksibilitet dhe kalueshmëri të mirë në arterie Trashësia e strutës: ≤ 90 mikrometër (μm) Dimensionet e kërkuara: Diametri i stentit: minimumi 2.25 mm deri minimumi 4.00 mm Gjatësia e stentit: minimumi 8/9 mm deri minimumi 36 mm	0	1
493	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit: Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një citostatiku të familjes Limus: Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus ose Biolimus. Mbështjellja e stentit: Pa polimer, ose Me polimer biodegradues, i cili shkrihet brenda ≤ 3 muajve pas implantimit.	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr) Materialet duhet të ofrojnë: Radiopacitet të lartë Forcë strukturore Fleksibilitet dhe kalueshmëri të mirë në arterie Trashësia e strutës: ≤ 90 mikrometër (μm) Dimensionet e kërkuara: Diametri i stentit: minimumi 2.25 mm deri minimumi 4.00 mm Gjatësia e stentit: minimumi 8/9 mm deri minimumi 36 mm	0	1

494	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit: Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një citostatiku të familjes Limus: Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus ose Biolimus. Mbështjellja e stentit: Pa polimer, ose Me polimer biodegradues, i cili shkrihet brenda ≤ 3 muajve pas implantimit.	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr) Materialet duhet të ofrojnë: Radiopacitet të lartë Forcë strukturore Fleksibilitet dhe kalueshmëri të mirë në arterie Trashësia e strutës: ≤ 90 mikrometër (μm) Dimensionet e kërkuara: Diametri i stentit: minimumi 2.25 mm deri minimumi 4.00 mm Gjatësia e stentit: minimumi 8/9 mm deri minimumi 36 mm	0	3
495	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit: Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një citostatiku të familjes Limus: Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus ose Biolimus. Mbështjellja e stentit: Pa polimer, ose Me polimer biodegradues, i cili shkrihet brenda ≤ 3 muajve pas implantimit.	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr) Materialet duhet të ofrojnë: Radiopacitet të lartë Forcë strukturore Fleksibilitet dhe kalueshmëri të mirë në arterie Trashësia e strutës: ≤ 90 mikrometër (μm) Dimensionet e kërkuara: Diametri i stentit: minimumi 2.25 mm deri minimumi 4.00 mm Gjatësia e stentit: minimumi 8/9 mm deri minimumi 36 mm	0	1

496	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit: Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një citostatiku të familjes Limus: Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus ose Biolimus. Mbështjellja e stentit: Pa polimer, ose Me polimer biodegradues, i cili shkrihet brenda ≤ 3 muajve pas implantimit.	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr) Materialet duhet të ofrojnë: Radiopacitet të lartë Forcë strukturore Fleksibilitet dhe kalueshmëri të mirë në arterie Trashësia e strutës: ≤ 90 mikrometër (μm) Dimensionet e kërkuara: Diametri i stentit: minimumi 2.25 mm deri minimumi 4.00 mm Gjatësia e stentit: minimumi 8/9 mm deri minimumi 36 mm	0	8
497	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit: Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një citostatiku të familjes Limus: Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus ose Biolimus. Mbështjellja e stentit: Pa polimer, ose Me polimer biodegradues, i cili shkrihet brenda ≤ 3 muajve pas implantimit.	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr) Materialet duhet të ofrojnë: Radiopacitet të lartë Forcë strukturore Fleksibilitet dhe kalueshmëri të mirë në arterie Trashësia e strutës: ≤ 90 mikrometër (μm) Dimensionet e kërkuara: Diametri i stentit: minimumi 2.25 mm deri minimumi 4.00 mm Gjatësia e stentit: minimumi 8/9 mm deri minimumi 36 mm	0	4

498	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit: Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një citostatiku të familjes Limus: Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus ose Biolimus. Mbështjellja e stentit: Pa polimer, ose Me polimer biodegradues, i cili shkrihet brenda ≤ 3 muajve pas implantimit.	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr) Materialet duhet të ofrojnë: Radiopacitet të lartë Forcë strukturore Fleksibilitet dhe kalueshmëri të mirë në arterie Trashësia e strutës: ≤ 90 mikrometër (μm) Dimensionet e kërkuara: Diametri i stentit: minimumi 2.25 mm deri minimumi 4.00 mm Gjatësia e stentit: minimumi 8/9 mm deri minimumi 36 mm	0	1
499	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit: Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një citostatiku të familjes Limus: Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus ose Biolimus. Mbështjellja e stentit: Pa polimer, ose Me polimer biodegradues, i cili shkrihet brenda ≤ 3 muajve pas implantimit.	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr) Materialet duhet të ofrojnë: Radiopacitet të lartë Forcë strukturore Fleksibilitet dhe kalueshmëri të mirë në arterie Trashësia e strutës: ≤ 90 mikrometër (μm) Dimensionet e kërkuara: Diametri i stentit: minimumi 2.25 mm deri minimumi 4.00 mm Gjatësia e stentit: minimumi 8/9 mm deri minimumi 36 mm	0	1

500	Stent Koronar me Elutim të Barnës (DES) për Trajtimin e Stenozave të Arterieve Koronare	Lloji i stentit: Stent i llojit Drug-Eluting Stent (DES) me elutim të një citostatiku të familjes Limus: Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus ose Biolimus. Mbështjellja e stentit: Pa polimer, ose Me polimer biodegradues, i cili shkrihet brenda ≤ 3 muajve pas implantimit.	Materiali i platformës (struktura e stentit): Cobalt-Chromium (CoCr) ose Platinum-Chromium (PtCr) Materialet duhet të ofrojnë: Radiopacitet të lartë Forcë strukturore Fleksibilitet dhe kalueshmëri të mirë në arterie Trashësia e strutës: ≤ 90 mikrometër (μm) Dimensionet e kërkuara: Diametri i stentit: minimumi 2.25 mm deri minimumi 4.00 mm Gjatësia e stentit: minimumi 8/9 mm deri minimumi 36 mm	0	2
501	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar.	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontratës lot 1	0	5
502	Stenta DES për trajtim të stenozave të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar.	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontratës lot 1	0	60

503	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar.	Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontratës lot 1	0	25
504	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar.	Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontratës lot 1	0	25
505	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar.	Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontratës lot 1	0	10
506	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar.	Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontratës lot 1	0	50

507	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar.	Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontratës lot 1	0	10
508	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar.	Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontratës lot 1	0	5
509	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar.	Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontratës lot 1	0	10
510	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar.	Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontratës lot 1	0	5

511	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar.	Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontratës lot 1	0	5
512	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar.	Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontratës lot 1	0	3
513	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar.	Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontratës lot 1	0	5
514	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar.	Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontratës lot 1	0	13

515	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar.	Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontratës lot 1	0	20
516	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar.	Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontratës lot 1	0	2
517	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar.	Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontratës lot 1	0	10
518	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar.	Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontratës lot 1	0	20

519	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar.	Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontratës lot 1	0	1
520	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar.	Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontratës lot 1	0	5
521	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar.	Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontratës lot 1	0	3
522	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar.	Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontratës lot 1	0	24

523	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar.	Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontratës lot 1	0	2
524	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar.	Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontratës lot 1	0	5
525	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar.	Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontratës lot 1	0	40
526	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar.	Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontratës lot 1	0	10

527	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar.	Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontratës lot 1	0	5
528	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar.	Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontratës lot 1	0	10
529	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar.	Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontratës lot 1	0	2
530	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar.	Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontratës lot 1	0	26

531	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar.	Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontratës lot 1	0	10
532	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar.	Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontratës lot 1	0	1
533	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar.	Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontratës lot 1	0	10
534	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar.	Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontratës lot 1	0	10

535	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar.	Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontratës lot 1	0	5
536	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar.	Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontratës lot 1	0	20
537	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar.	Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontratës lot 1	0	4
538	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar.	Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontratës lot 1	0	2

539	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar.	Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontratës lot 1	0	15
540	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar.	Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontratës lot 1	0	19
541	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar.	Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontratës lot 1	0	1
542	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar.	Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontratës lot 1	0	10

543	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar.	Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontratës lot 1	0	2
544	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar.	Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontratës lot 1	0	6
545	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar.	Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontratës lot 1	0	2
546	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar.	Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontratës lot 1	0	30

547	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar.	Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontratës lot 1	0	15
548	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar.	Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontratës lot 1	0	5
549	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar.	Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontratës lot 1	0	36
550	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar.	Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontratës lot 1	0	5

551	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar.	Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontratës lot 1	0	1
552	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar.	Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontratës lot 1	0	15
553	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar.	Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontratës lot 1	0	3
554	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar.	Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontratës lot 1	0	3

555	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar.	Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontratës lot 1	0	2
556	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar.	Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontratës lot 1	0	5
557	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar.	Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontratës lot 1	0	10
558	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar.	Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontratës lot 1	0	2

559	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar.	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontratës lot 1	0	2
560	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar.	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontratës lot 1	0	5
561	Suture Absorbable Polyglactine	USP 2	35mm 75cm 1/2 RB	0	21
562	Syringe Disposable Luer tip	10 ml	0	0	2199
563	Syringe Disposable Luer tip	5ml	0	0	5
564	Tela Diagnostik - Diagnostic wire	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për tela diagnostik të përdorur gjatë koronarografisë.	1. Specifikimi Teknik Minimal • Për insertim. • Stabilizim dhe pozicionim të kateterave angiografik. • Me interval gjatësie 175-185cm. • Me lakësi (curve) J 0.035".	0	1539
565	Tramadol	50 mg	2 ml	50 mg / ml	31
566	Urine Bag With Drain	2L	0	0	203
567	Verapamil Hydrochloride	2.5mg	2ml	2.5mg/ml	318

872
873
874
875
876
877
878
879

880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919

920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959

960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999

1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031

1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277

1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317

1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357

1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397

1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436